




colombi culture



Couple de Lynx de Pologne maillés bleus à vol blanc
G.P.H. à La Roche sur Foron (1974)
Propriétaire : M. Maury
(Photo Ebner)

Bulletin
de la
Société
Nationale
de
Colombiculture

N° 7 - JUILLET 1977

BULLETIN TRIMESTRIEL

COLOMBICULTURE

Bulletin n° 7
JUILLET 1977

PRESIDENT :

Roger LAMY
Teillé 72290 Ballon.

SECRETAIRE GENERAL :

Claude SIMON
84, rue A.-Briand
90000 Offemont.

TRESORIER :

Georges TANCHOU
76, rue Alexandre-Ribot
59510 Hem.

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :

Claude SIMON

REDACTION :

Mme FRANCQUEVILLE
19, rue du Moulin
ABBECOURT 02300 CHAUNY.

SOMMAIRE

Le Lynx de Pologne	1
Le Lynx de Pologne en France au début du XX ^e siècle	3
Quelques aspects de l'évolution du Lynx de Pologne	4
Standard du Lynx de Pologne ..	5
Variétés de Pigeons Paons ..	6
Hérédité du dessin	7
Les jeunes au plateau	8
Les vers du pigeon	8
Lu, vu ou entendu pour vous... ..	9
Entraînement des Haut-Volants et du Tippler en particulier	10
Questions - Réponses	11
Les Expositions	13
Le coin du Trésorier	14
Calendrier des Expositions ..	15
Première Nationale du Pigeon S.N.C.	16

LE LYNX DE POLOGNE

par H. ZORDAN, Juge de la S.C.A.F.

De plus en plus d'amateurs de Lynx de Pologne


Dans la gamme des pigeons de race, depuis quelques années le Lynx de Pologne prend de plus en plus de place dans nos expositions et il n'est pas rare de trouver cette race représentée par une centaine d'exemplaires. Les plus répandus sont les bleus maillés à vol blanc, suivis des bleus unis barrés blanc puis les noirs unis barrés blanc. Dans les variétés plus rares les noirs maillés blanc, puis très rares les rouges unis barrés blanc, les rouges maillés blanc et les jaunes unis et maillés blanc.

D'où nous arrive ce pigeon ?

A l'origine ces pigeons étaient élevés en Pologne dans les campagnes de Galicie, Cracovie et environs, mais ceux-ci n'avaient pas l'allure ni la couleur de nos pigeons actuels. La variété noire était même plus courante que la bleue. C'est par un travail de patience de la part de l'éleveur Edmond Krebs de Halle que cet oiseau a atteint sa perfection.

La Forme

Avant tout le Lynx de Pologne est un pigeon de forme et de rapport, qui n'a aucune valeur s'il présente la forme biset ou poule. Sa taille n'atteint pas celle du Strasser. On le demande ramassé, assez court, robuste et bas sur pattes. A sa forme ramassée convient naturellement une poitrine bombée, assez basse. S'il manque de poitrine il apparaîtra trop long. Les ailes doivent bien recouvrir le dos. La partie arrière est-elle trop longue le pigeon aura l'air étriqué, néanmoins il ne faudra pas rechercher les sujets trop forts, le Lynx doit rester pigeon de rapport et un bon volier capable de se nourrir à la campagne. Pour cette raison le meilleur prix en exposition ne reviendra pas forcément au plus gros sujet, s'il n'est pas conforme aux autres points du standard.



Lynx noir barré blanc

La Couleur

Les plus grandes difficultés nous proviennent du dessin et de la couleur. Au départ ces pigeons présentaient des taches blanches irrégulières, souvent rouillées sur l'ensemble du manteau. Par introduction d'Étourneau bleu et de Boulant bleu le dessin commence à se fixer pour nous donner les beaux sujets actuellement présents.

Le maille bleu à vol blanc

La couleur du corps, tête, cou et poitrine est bleue plus ou moins foncée avec des reflets verts et roses sur le cou et la gorge. La couleur bleue du corps doit également se prolonger jusque sous la queue sans traces noires sur les flancs ou les culottes. Il faudra éviter les poitrines charbonnées ou martelées, néanmoins certains sujets avec flancs colorés seront à conserver pour l'élevage, ceci constitue une réserve

de matière colorante à introduire lorsque la sous-couleur et les manchettes auront tendance à blanchir. Il ne doit pas y avoir de blanc autour de l'anus, le sous-ventre et les manchettes. La queue est bleu foncé avec une large barre noire sur le bout, sans traces grises ou ocre.

C'est le dessin du manteau qui donne au Lynx de Pologne son remarquable aspect. Chaque plume du manteau possède trois couleurs, bleu, blanc et noir, formant deux ovales blancs bordés de noir, placés sur chaque côté de la hampe de la plume. Sur le bout une petite tache bleue en forme de triangle termine le dessin.

Plumes du bouclier petites et moyennes couvertures


- N° 1 bonnes marques, taches ovales bien formées laissant apparaître la maille triangulaire.
- N° 2 ovales un peu grands, ce qui diminue le triangle bleu, d'où les sujets à manteau liséré et trop clairs.
- N° 3 taches ovales irrégulières, triangle ouvert à la base, sujets avec maillage plaqué et grossier.

Une erreur à éviter en élevage sera d'accoupler deux sujets présentant le même dessin (ou trop clair ou trop foncé) le meilleur moyen pour obtenir de beaux sujets d'exposition consiste à contraster les dessins pour équilibrer la matière colorante. A un mâle liséré-clair il faudra accoupler une femelle à dessin bien marqué et assez foncé.

PETITES COUVERTURES



MOYENNES COUVERTURES



Les rémiges primaires des sujets à vol blanc varient de 6 à 10. Les meilleurs en possèdent 8 ou 9 de chaque côté. Plus le vol sera important c'est-à-dire 10×10 plus le sujet aura tendance à éclaircir. De même que pour le dessin du bouclier, en élevage on accouplera un pigeon possédant des vols faibles 6×6 ou 7×7 à un pigeon 9×9 ou 10×10 afin d'équilibrer les vols à 8×8 ou 8×9 .

Souvent on remarquera dans les expositions des bêtes avec 7×7 qui présenteront ailes fermées une tache noire à la base du vol. Ceci ne sera pas forcément une insuffisance de vols, puisque d'autres sujets même avec 6×6 ne la laisseront pas apparaître. C'est donc dans la forme du pigeon qu'il faudra rechercher le défaut. Un sujet court et large aura également un plumage court alors que le contraire se produira sur un sujet élancé, les plumes de vol seront longues et étroites, d'où l'apparition de cette tache noire sur l'aile repliée. Éliminer les sujets avec des vols intermédiaires colorés.

Les barres des ailes forment deux bandes blanches incurvées, bien séparées par un liséré noir. Ces barres

devront être d'un blanc pur sans traces de poivrage, ni de rouille.

Souvent les jeunes au plateau présenteront de la rouille sur le bouclier et les barres. Cette rouille disparaît la plupart du temps à la première mue. Une erreur serait de les sacrifier trop tôt.



Lynx bleu barré à vol blanc
Photo tirée du livre "Encyclopedia of pigeon breeds", avec l'aimable autorisation de Levi Publishing Company

Le bleu uni barré blanc (à vol coloré ou à vol blanc)

Très proche parent du maillé bleu nous aurons le bleu uni. Ici l'éleveur n'aura pas la difficulté du dessin du manteau. En général les teintes sont pures et régulières, la difficulté se trouvera au niveau des barres. Celles-ci ne devront être ni trop étroites ni trop larges. Par contre bien parallèles et ne se touchant pas sur la partie supérieure de l'aile. Chaque barre sera bordée de noir, toute trace de rouille est à considérer comme défaut grave.

Le noir uni barré blanc et le noir maillé blanc (à vol coloré ou blanc)

Du point de vue taille pendant longtemps la variété noire a été plus faible que la bleue, puis elle a été alourdie par introduction de bleu uni, ceci au détriment de la couleur. C'est ainsi que pendant quelques temps les noirs avaient le dos et une partie du corps bleuté, ceci s'est arrangé par la suite pour obtenir les beaux sujets actuels, d'un beau noir brillant avec reflets



Lynx de Pologne rouge maillé
("Encyclopedia of pigeon breeds")

métalliques sur le cou et à la gorge. Un souci majeur : les barres, qui sont demandées étroites et blanc pur. Dans l'ensemble celles-ci sont à ce jour assez bonnes. Bien entendu il ne faudra pas les regarder à la loupe car on y trouvera toujours quelques pointillés noirs. Si ceux-ci ne sont pas visibles à l'œil nu il faudra considérer le pigeon comme très beau spécimen. En ce qui concerne les vols chez les sujets à vol blanc les mêmes critères seront valables que pour les bleus à vol blanc.

Chez les noirs maillés blanc l'ensemble du corps est noir avec reflets métalliques au cou et à la gorge. Le manteau est blanc maillé de noir. Le dessin doit être régulier, ainsi que les barres blanches sans poivrage trop important.

**Le rouge uni ou maillé,
ainsi que le jaune uni ou maillé**

Ce sont les variétés les plus rares de la gamme. On trouve actuellement quelques beaux sujets en

rouge uni barré blanc, si la couleur est bonne ce seront encore les barres qui nous donneront le plus de fil à retarder, elles sont toujours larges et irrégulières. Quant à la taille celle-ci n'atteint pas non plus celle du bleu uni.

Pour les rouges et les maillés jaunes, bien souvent le manteau sera presque blanc avec de petites traces rouges ou jaunes lisérées. Les parties rouges ou jaunes sont fortement diluées par le blanc dominant. Un jugement très clément est conseillé pour ces raretés.

Les Yeux

Dans toutes les variétés les yeux seront rouge-orangé. Il faudra les rechercher le plus vif et le plus rouge possible.

Le Lynx de Pologne en France au début du XX^e siècle

J'ai eu la chance de découvrir dans de vieux papiers, un article écrit par le Dr F. Louart sur le Lynx de Pologne, publié dans un numéro du journal "L'avi-culteur Français" vers 1930.

Le Dr Louart était un grand colombiculteur et un juge réputé qui présida le Pigeon Club Français après Robert Fontaine, de 1918 à 1931, date de sa mort.

L'article débute par les deux caractéristiques principales du Lynx : **« Excellent pigeon de rapport, allant bien aux champs... superbe oiseau de volière... »**.

Je ne rapporterai pas la totalité de cet article dont certains passages sont périmés. La description du Lynx dans ce qu'elle garde de constant, ferait double emploi avec l'excellent exposé de M. Zordan. De plus, certains changements ont été opérés, certaines variétés ont atteint, maintenant, une plus grande perfection. Il n'en reste pas moins que la conception du Lynx qu'avait le Dr Louart, la plupart de ses principes de sélection restent valables de nos jours.

Laissons-le parler :

« Pigeon particulièrement prolifique... »

Le Lynx est, en effet, un excellent reproducteur et un merveilleux nourricier. Il n'est pas rare de voir des sujets de cette race faire du huit à neuf couvées par an produisant à chaque fois deux beaux jeunes qui commencent à manger seuls au moment où éclot la couvée suivante...

Les pigeonceaux, dans cette race, sont d'ailleurs précoces et, si vous voulez les conserver, vous pouvez aisément les séparer des parents à un mois. A cette époque, ils pèsent souvent plus du demi-kilo et sont d'incomparables sujets pour la casserole, si leur forme ou leur plumage les font rejeter par l'éleveur...

Le Lynx est trapu et fortement musclé ; il a la poitrine ample et saillante, le dos large et arrondi ; c'est un pigeon dont le corps est bien ramassé et plutôt court. Il est bas et bien d'aplomb sur les jambes... ».

Dans le chapitre "Variétés", je relève cette phrase qui prouve que déjà, au début de ce siècle, le Dr Louart était à l'avant-garde du progrès : « Pour notre part, depuis que nous nous occupons du Lynx, nous avons cherché à créer dans cette race une nouvelle couleur fondamentale : le rouge. Nous avons ainsi obtenu après trois années d'efforts des rouges maillés : 1^{er} à vol plein, 2^e à vol blanc, qui nous permettent d'espérer pouvoir fixer ces nouvelles variétés ».

Nous arrivons aux chapitres les plus intéressants de cet article :

« Pour bien sélectionner les pigeonceaux... »

Dès le nid un éleveur un peu expert peut préjuger de la valeur future du sujet comme forme et comme dessin. Le maillage des ailes n'est cependant pas bien dessiné chez les pigeonceaux ; mais un sujet à barres bien nettes où le blanc, quoique rare, apparaît assez régulièrement dans tout le manteau, deviendra, en règle générale, très bien maillé à la mue...

Vous trouvez parfois quelques jeunes sujets dont le fond du manteau est rosé ou même rougeâtre ; ne vous hâtez pas de les rejeter à cause de cette teinte, car souvent elle disparaît à la mue, et le blanc prend sa place.

Il n'y a pas lieu (à moins qu'il ne s'agisse de sujets exceptionnels comme forme et comme grosseur) de s'attacher aux pigeonceaux ayant déjà le manteau trop blanc ou à ceux ayant des plumes blanches dans le cou, ...à la queue, au ventre, aux manchettes ; ou, parmi les sujets à vol blanc, à ceux n'ayant pas plus de trois ou quatre couteaux blancs à chaque vol. Il faut, en effet, être d'autant plus sévère dans la sélection des jeunes que la surproduction du Lynx permet de choisir entre un plus grand nombre de sujets...

Comment concevoir l'accouplement.

Roszwadowsky, cité par M. Lietze, dit qu'il faut éviter l'accouplement de sujets de même dessin. Il conseille d'accoupler un unicolore avec un maillé, mais recommande d'accoupler toujours un sujet à vol blanc avec un autre à vol blanc et un sujet à vol plein avec un à vol plein... Pour notre part, nous avons souvent obtenu de bons résultats, en accouplant un sujet où le blanc domine dans le maillage avec un barré ou avec un sujet insuffisamment maillé ; de même, en accouplant un pigeon n'ayant pas les 7 couteaux blancs à chaque vol avec un autre en ayant 9 ou 10, encore convient-il, en pareil cas, de bien connaître la souche de ses reproducteurs. Nous sommes d'ailleurs absolument de l'avis de Roszwadowsky ; il ne faut pas accoupler un sujet à vol blanc avec un sujet à vol plein, car on n'obtiendra que très rarement des oiseaux ayant un nombre de couteaux blancs suffisant, ou des sujets à vol coloré correct ; par contre on aura en quantité des sujets ayant un vol coloré d'un côté et un vol blanc de l'autre ; ou des sujets ayant des couteaux blancs mêlés à des couteaux colorés ; ou enfin des sujets

n'ayant que 1, 2, 3 ou 4 couteaux blancs au vol, ce qui est tout à fait défectueux. Je suis, par contre, absolument partisan de l'accouplement des maillés avec les unicolores barrés, quand il s'agit de sujets où le blanc domine dans le maillage, car alors le trop de l'un compense le moins de l'autre. Toutefois, n'espérez pas n'avoir que des sujets correctement maillés par ces accouplements; vous obtiendrez de

très beaux barrés, quelques sujets bien maillés et assez souvent des sujets ayant trop de blanc dans le maillage ou encore des sujets insuffisamment maillés ».

En conclusion, le Dr Louart souligne l'intérêt que présente l'élevage du Lynx de Pologne, "pigeon de produit ou oiseau de luxe".



Quelques aspects de l'évolution du Lynx de Pologne

par J. FRANCOEUVILLE, Juge de la S.C.A.F.

Il est difficile de remonter dans le temps et de retrouver la trace de l'évolution de nos races de pigeons. On a beau en posséder quelques éléments, ce qui manque, c'est le fil conducteur qui permettrait de rattacher les diverses phases de cette évolution.

Certains auteurs pensent que le Lynx de Pologne est apparenté au pigeon maillé jacinthe qui fut très répandu en France, que décrivent Buffon en 1774, Boitard et Corbié en 1824. L'origine du maillé jacinthe est incertaine. Lyell (1887) le classe dans les races françaises, Spruijt (1927) le place dans le chapitre des pigeons allemands de couleur mais précise qu'il ne connaît pas son origine. Il pense qu'il a des liens étroits avec les étourneaux. On voit par là que ce type de dessin était assez répandu en Europe.

Vers le milieu du siècle dernier les Lynx de Pologne étaient nombreux dans les fermes de la région de Cracovie. On parlait, à l'époque, d'un biset de Pologne. Il était élevé en liberté et allait chercher sa nourriture dans les champs.

Comment a-t-il ensuite évolué ?

Au siècle dernier, les croisements étaient à la mode, écrit Edmund Zurth, dans son livre "Die Welt der Tauben". On a donc croisé ces bisets de Cracovie avec des boulangers d'une race maintenant éteinte. Certains sujets avaient des huppées, d'autres, des plumes aux pattes. Il y en avait des bleus et des noirs mais pas d'un noir franc. Vers 1870, de pigeon des champs, le Lynx s'élève à un plus haut rang grâce à la beauté de ses barres et de son maillage. On l'a probablement appelé Lynx à cause des taches qui font ressembler son manteau à la robe du félin appelé aussi loup-cervier.

Le Professeur von Roszadowsky d'Autriche-Hongrie le découvrit. Les éleveurs de ce pays entretenaient des relations amicales avec les éleveurs allemands. Il y eut donc des lynx cédés aux Allemands par les éleveurs d'Autriche-Hongrie et d'autres importés de Pologne par les Allemands. Mais que de diversité dans les sujets élevés à cette époque. Ce n'est que beaucoup plus tard que sera fixé le type actuel qui fait que le lynx n'a plus de polonais que le nom.

Après sa découverte par le Prof. Roszadowsky, l'élevage du Lynx s'est répandu dans plusieurs pays d'Europe. Le numéro spécial du 15 Février 1926 du magazine "Vie à la campagne" fait le point à ce sujet: Le Lynx de Pologne « est très répandu en Allemagne, en Autriche, en Belgique. Il fut introduit surtout en France par le Dr Louart vers 1906. Les pigeons présentés par cet amateur avant guerre étaient bien maillés, courts, très amples de poitrine et volumineux. Après guerre, il nous est venu de Rhénanie et d'Alsace nombre de Lynx de Pologne très typés et bien maillés, qui n'ont pas fait oublier les beaux types qu'on avait obtenus en France avant guerre... ».

Donc déjà avant la 1^{re} guerre mondiale, l'élevage du Lynx de Pologne était conduit, en France, de main de maître, par le Dr Louart. Il appliquait déjà, au début

de ce siècle, les mêmes principes essentiels de cet élevage qu'on peut lire dans les journaux allemands colombicoles récents. Il avait également touché à une variété rare encore maintenant puisqu'il avait réalisé des lynx rouges maillés. Il est regrettable que ses travaux n'aient pas été poursuivis en France après sa mort.



Le docteur Louart avec ses Lynx bleus maillés à vol blanc et à vol plein. Photo extraite de "Vie à la Campagne", février 1926. Ces pigeons présentent à un très haut degré de perfection toutes les caractéristiques de la race.

D'après le journal allemand: "Kleintier Züchter", c'est entre les deux guerres mondiales que le Lynx a atteint en Allemagne son type et la perfection de ses dessins actuels, grâce à Edmund Krebs de Halle. Sa forme ramassée, la largeur et la profondeur, la rondeur de sa poitrine sont perfectionnées. Le maillage devient plus fin et plus pur. On tolère les croupions blanchâtres qui vont de pair avec la pureté du maillage. Cependant, on s'aperçoit que l'un des écueils auxquels on se heurte maintenant est l'envahissement par le blanc. Nous avons relevé dans le journal "Kleintier Züchter" quelques conseils qui permettent notamment de lutter contre ce défaut:

« Chez le bleu maillé, la couleur doit être très homogène, que le bleu soit clair ou foncé. La couleur de la tête est uniforme; la limite entre le cou et la poitrine est nette. Il faut éviter que les dessous soient charbonnés, le bleu doit être homogène jusqu'au dessous de la queue. Cependant, certains sujets présentent des taches plus foncées aux cuisses et au ventre. Ils peuvent être utilisés comme sujets de travail pour redonner de la couleur à ceux où le blanc devient envahissant.

Chez les sujets à vol plein, il faut bannir ceux qui ont du blanc au ventre et des manchettes.

Parfois, les sujets à vol blanc ont de légères manchettes. On sera moins sévère avec ceux-ci car il ne faut pas oublier qu'il y a corrélation entre la couleur des plumes du bout de l'aile et celle des plumes des jambes ».

L'auteur remarque ensuite que « les mâles ont tendance à être plus clairs que les femelles. Le trait noir du dessin est plus fin chez eux. Il existe cependant des femelles qui ont un maillage très fin. Elles ne

peuvent être utilisables que par un éleveur expérimenté qui pourra les accoupler avec des mâles bleus.

Les sujets à barres blanches peuvent être accouplés avec les maillés bleus afin de résister à l'envahissement du blanc.

Autre remarque intéressante : « Les noirs qui ont la moins tendance à donner une progéniture où le blanc est prédominant sont les noirs brillants. Il en est de même pour les rouges.

Un autre danger est évoqué dans le journal : "Geflügel Börse". C'est un cri d'alarme concernant le poids du Lynx. En effet, on peut remarquer que beaucoup de Lynx dépassent les 600 g préconisés par le standard. On les recherche de plus en plus gros, pense l'auteur de l'article, mais cela ne sert pas les intérêts de l'éleveur car des inconvénients majeurs sont liés à l'augmentation exagérée du volume et du poids : On obtient de plus en plus d'œufs non fécondés, des œufs à deux jaunes. La descendance est minime et inutilisable. C'est donc à la ruine de la race que mène cette politique. La solution consiste à sélectionner des oiseaux de taille moyenne bien conformés.

La même auteur précise la manière de repérer les pigeonneaux les mieux conformés, vers l'âge de deux semaines : On les prend dans la main et l'on apprécie entre le pouce et l'index la distance entre le dos et le bréchet. Les meilleurs sujets sont les plus profonds ; ils auront des pectoraux très développés, donc une poitrine large. Par opposition, les sujets étroits et longs sont généralement peu profonds.

Qu'il soit pigeon de forme ou pigeon de couleur, il ne faut donc pas oublier que le Lynx doit être un pigeon de rapport bien conformé, de taille moyenne.

Il a la réputation d'être très prolifique mais on peut se demander s'il est encore le merveilleux reproducteur dont parlait le Dr Louart. Espérons qu'il existe des souches dont on a travaillé la productivité en même temps que la couleur et le dessin.

Note : Une thèse ayant pour titre : "L'alimentation du pigeon de rapport" a été rédigée par le Docteur Vétérinaire J.-P. Boidot en 1968. Ce sont des Lynx de Pologne et des Carneaux qui ont été utilisés presque exclusivement pour les expériences ayant servi à étayer cette thèse.



Standard du Lynx de Pologne

Pigeon originaire de la Galicie occidentale. Créé il y a environ 150 ans à partir de pigeons bisets et de boulangers de Silésie. Il est apparu en Allemagne vers 1870.

Aspect général :

Pigeon grand et large, garde la forme du Biset mais avec une poitrine plus large et plus profonde. Poids : 600 g environ ; longueur : 38 à 40 cm.

Tête : Grande, lisse, au front assez haut et large.

Bec : De longueur moyenne et de couleur foncée ; il est clair chez les jaunes et les rouges. Morilles peu développées, d'un grain fin.

Yeux : Iris orangé à rouge.

Tour de l'œil : Étroit, lisse, d'une couleur gris bleu tendre ; il est clair chez les rouges et les jaunes.

Cou : Assez court, large, épais à la base, la gorge est bien découpée. Boule très légèrement.

Poitrine : Large et pleine, tour de poitrine de 30 à 33 cm.

Dos : Court et large, légèrement bombé.

Ailes : Courtes et larges ; la courbure de l'aile est cachée par les plumes de la poitrine, les pointes des ailes se touchent au-dessus de la queue.

Queue : Courte et large, en concordance avec les ailes.

Pattes : Courtes, sans plumes, rouge carmin, cuisses cachées par les plumes du ventre.

Plumage : Duveteux, serré.

Variétés : Bleu maillé blanc ou barré blanc ; noir maillé blanc ou barré blanc ; rouge maillé blanc ou barré blanc ; jaune maillé blanc ou barré blanc. Toutes ces variétés peuvent être à vol blanc ou à vol plein.

Couleur et Dessin

BLEU MAILLÉ : Couleur de fond bleu-bleu, le bouchier étant recouvert de marques régulières. Les barres sont blanc pur.

La tête, le cou et la poitrine sont de couleur bleu foncé, le cou et la gorge ont des reflets verts et roses ; le corps est d'un bleu plus pâle. La queue est bleu foncé avec une large bande noire s'arrêtant à 1/2 cm de l'extrémité. Le fond du manteau est maillé d'un

blanc pur, chaque triangle bleu étant bordé d'un fin liseré noir. Dans la variété à vol blanc, les 10 grandes plumes du vol doivent être blanches ; il suffit cependant qu'il y ait 7 couteaux blancs de chaque côté pour que le vol fermé paraisse correct.

BLEU BARRÉ : Couleur de fond bleu-bleu avec des barres blanches nettes, bordées vers l'extérieur d'un liseré noir.

NOIR MAILLÉ : Couleur de fond noir intense, bouchier recouvert de marques très régulières.

Tout le corps est noir ; les plumes du cou sont richement colorées de reflets métalliques. Le manteau doit être blanc pur, maillé de noir. La disposition des marques est semblable à celle du maillé bleu, mais le noir remplace le bleu.

NOIR BARRÉ : Couleur de fond noir intense, avec des barres blanc pur, régulières et nettement marquées.

ROUGES ET JAUNES : Dessins et marques semblables à ceux des bleus ou noirs.

Défauts graves

Sujets trop faibles - poitrine étroite et plate - dos long - plumes aux pattes - couleur mate ou impure - dessin rouillé - barres poivrées - culottes blanches - plumes blanches au ventre ou à l'anus - moins de 6 rémiges blanches dans le vol - bec foncé chez les rouges ou les jaunes - œil perlé - dessin grossier ou liseré - plumes blanches dans la nuque - rémiges secondaires blanches - plumes colorées dans le vol blanc.

Bague : C.

Nous prions nos correspondants d'envoyer leurs articles, comptes rendus, photos, etc., pour le prochain bulletin, avant le 20 SEPTEMBRE.

Les textes seront, de préférence, dactylographiés sur des feuilles de format 21 x 29,7 ou écrits à la main très lisiblement.

VARIÉTÉS DE PIGEONS PAONS

(suite de la page 4 du numéro 6 d'Avril 1977)

Il y a enfin les sujets huppés et pattus dont on trouve des amateurs en Angleterre et en Écosse.

Cette variété, d'ailleurs très élégante, a surtout été conservée dans son pays d'origine, l'Inde.

Vers 1890, les éleveurs des États Unis s'étant intéressés aux races de pigeons fantaisie avaient importé des souches de "queue de paon". Ils les ont bien "travaillés" et ont conservé de beaux échantillons huppés et pattus. Dans cette variété, les sujets se présentent sous des robes de toutes couleurs : unies, unies avec barres aux ailes, unies avec barres uniquement sur la queue.



Pigeon paon soie
(Photo extraite de "Encyclopedia of pigeon breeds")

PIGEON PAON SOIE ou encore pigeon trembleur paon soie (*Columba laticauda setacea*)

C'est une catégorie qui se distingue de toutes les autres par la nature spéciale de son plumage. Les barbes des plumes ne sont pas collées, elles sont soyeuses, séparées et tombantes comme des franges de soie ou de coton. Le plumage est le même que celui des volailles (nègre sole). Les ailes ne permettent pas au sujet de voler aussi doit-il vivre constamment au sol. N'ayant aucune autonomie ce pigeon cause de nombreux problèmes à l'éleveur. Son infirmité nuit à sa fécondité. Ses gestes sont très laborieux, limités et lui occasionnent tous les déboires. Néanmoins il est doux, familier, s'attache ou cherche à s'attacher à son maître de qui il attend tout de l'existence. C'est le plus esclave des colombins. Ayant l'épiderme non recouvert de duvet protecteur il est très sensible au froid. Il doit être maintenu dans un local à température constante et assez élevée quand il vit dans des régions à climat rude.

Son aspect général n'est pas désagréable. Il surprend souvent les néophytes, mais conquiert rapidement leur sympathie. La robe de ce pigeon, toujours belle, donne l'impression d'une parure artificielle.

Il est originaire de l'Asie où il vit toujours en meilleure santé que chez nous.

Cette variété n'a jamais encombré les expositions et pour cause. Elle a pratiquement disparu des élevages européens.

On trouve ces pigeons sous toutes les couleurs des robes unies des queues de paon. Les principales qualités exigées sont celles du type normal, avec bien entendu, une restriction sur les plumes et le plumage.

Les Écossais ont été les premiers séduits par ce genre de trembleur, qui à l'origine avait une queue très étroite. Par des croisements avec des sujets ordinaires, ils sont arrivés à obtenir un produit ayant un plumage plus solide.

L'accouplement de pigeon paon soie avec un homologue normal donne des produits métissés avec un plumage soyeux, mais souvent les barbes des plumes sont plus ou moins décollées. Dans une même nichée on peut aussi retirer un jeune normal et un autre au plumage velu.

Le queue de paon n'est pas le seul à être marqué par cette anomalie. On rencontre aussi quelques

autres pigeons — genre bizet qui sont affublés de la même façon que ceux-ci.

Quelques amateurs, attirés par une singulière curiosité, ont contribué à élever des volailles de cette espèce — peut-être aussi pour les sauver d'une disparition certaine à l'état sauvage.

De nos jours, ces pigeons paraissent voués à une retraite dans un parc de réserve des animaux en voie de disparition.

PIGEON PAON CAPUCIN

Au moment de clore l'inventaire, déjà important, des multiples variétés de "queue de paon", je m'aperçois d'un oubli. L'absence de cette création aurait certainement manqué à la collection...

Je laisserai à Robert Fontaine, le récit de cette aventure :

Le Paon-Capucin

Ce croisement a sans doute été tenté par un amateur, mais il n'est jamais apparu aux expositions. Il a été décrit par un aviculteur, en 1893, et sa description a été reproduite dans certains livres et journaux, nous la donnons simplement à titre de curiosité.

Les colombophiles pensaient, sans doute, avoir épuisé la série des fantaisies, avec les créations les plus bizarres qu'on puisse imaginer. Ils avaient oublié une combinaison, qui pourtant est toute naturelle, et semble réunir le maximum d'élégance, en même temps qu'elle présentait à réaliser le maximum de difficultés.

Nous avons sous les yeux la photographie d'un couple de pigeons obtenus tout récemment, après de longs et patients efforts, par un amateur, dont la modestie est telle, qu'il nous a prié de ne pas le nommer pour le moment. Il tient à ne montrer ses pigeons en public que quand il pourra en mettre en ligne six couples absolument pareils. Ces pigeons sont des Paons-Capucins, c'est-à-dire qu'ils ont l'arrière des meilleurs Queue-de-Paon écossais, et la tête des Capucins les mieux capuchonnés. Ils sont complètement blancs.

L'amateur qui les a produits a eu le bon sens de ne pas chercher à compliquer son œuvre, par la difficulté de couleur, et il s'est contenté de prendre les auteurs de son produit dans les blancs purs ; n'ayant ainsi à sélectionner que dans le sens de la forme et de la position des plumes. La tâche était déjà suffisamment ardue, et voilà, a-t-il avoué, plus de sept ans qu'il y travaille, et maintes fois il a été sur le point de se décourager. Mais rien n'est tenace comme un colombophile et le succès qu'il a la conviction de tenir à présent, lui a déjà fait oublier ses peines.

Bientôt le Paon-Capucin sera reconnu comme une variété classique, et le temps n'est pas éloigné, où il figurera officiellement dans les programmes de nos expositions avicoles.

On trouvait déjà des amateurs pour payer au poids de l'or une paire de Paons d'Écosse, ou une paire de Capucins, quel prix ne trouvera-t-on pas d'une paire de Paons-Capucins absolument réussis ?

Les riches amateurs ont encore de beaux jours, et les amateurs de monographies pourront ajouter à leur livre un chapitre nouveau.

Tant il est vrai qu'une œuvre, si parfaite soit-elle, n'est jamais complète, et qu'en tout, surtout en aviculture, il faut toujours du nouveau, n'en fût-il plus au monde.

NOTE. — Nous croyons fort que la photographie envoyée à l'aviculteur, qui en donne la description ci-dessus, était une photo truquée, comme il est facile d'en faire actuellement, et qu'il a été mystifié à ce sujet, car jamais depuis 1893, donc depuis 29 ans, nous n'avons rencontré ce phénomène aux expositions. Le créateur a dû cependant avoir le temps d'arriver à un bon résultat, à moins qu'il soit mort avant d'avoir pu exhiber ses produits ?

Bénoni PROYART,
Juge S.C.A.F.

Hérédité du dessin

Nous avons déjà eu l'occasion d'exposer dans cette revue qu'il faut discerner deux notions distinctes concernant le plumage du pigeon : les couleurs de base, sur lesquelles nous ne reviendrons pas, et les dessins de base.

Les dessins que nous allons examiner sont ceux que l'on peut observer sur la partie de l'aile nommée bouclier. Le bouclier comprend les rémiges secondaires et les plumes de couverture de l'aile.

On remarque, chez beaucoup de pigeons, quelle que soit leur couleur, des zones ou des taches fortement colorées et d'autres plus claires. Il a été établi que les pigments étaient de même nature sur tout le bouclier mais qu'ils étaient répartis différemment suivant les zones considérées.

Dans les zones paraissant intensément colorées, les pigments sont disposés parallèlement, à des intervalles réguliers, dans les barboles des plumes. Dans les zones d'aspect plus clair, les pigments sont disposés par groupes. La réflexion de la lumière produit deux effets différents suivant la répartition des pigments. C'est ce phénomène qui nous fait percevoir par exemple, du bleu à côté du noir, alors que le pigment est le même.

Pour plus de précision nous utilisons la couleur bleue, très connue, comme élément de travail mais soulignons le fait que les dessins considérés existent en d'autres couleurs.

Le dessin peut prendre les apparences suivantes :
— écaillé noir, ne laissant paraître que très peu de bleu. Il est appelé "T pattern" par les Américains (pattern = dessin). Son symbole est CT.



L'extrémité bleue de la plume dessine un T.

- écaillé, le bleu et le noir prenant plus ou moins de place. Symbole : C.
- barré : + (c'est le dernier du biset).
- sans barres. Symbole : c.

Tout pigeon possède deux de ces caractères situés sur une paire de chromosomes homologues dont l'un est d'origine paternelle et l'autre d'origine maternelle.

Le dessin n'est pas toujours apparent car un autre caractère peut le masquer : c'est ce qui se produit, par exemple, chez les pigeons uniformément rouges (rouge récessif) comme le Carneau. Le rouge récessif masque les dessins ; c'est le phénomène nommé épistasie. Notons qu'on remarque parfois des traces de dessins sur les boucliers des mauvais Carneaux (couleur nuageuse). C'est probablement parce que le masque n'est pas toujours parfait et laisse transparaître des ombres.

Avant de considérer divers accouplements, précisons que les gènes CT, C, + et c sont des allèles et que par conséquent chacun d'eux peut être situé au même endroit sur un chromosome. L'ordre de la dominance de cette série d'allèles est le suivant : CT est dominant par rapport à C, lui-même dominant par rapport à + qui domine c.

Rappelons les notions de génotype et phénotype, termes que nous allons devoir utiliser. Le phénotype c'est ce qui apparaît des caractères d'un individu, tandis que le génotype c'est la combinaison de tous ses gènes. Ainsi un pigeon bleu barré (phénotype) peut avoir deux combinaisons différentes de gènes (génotype) pour le dessin :

- + // + il est pur
- + // c il est impur ou hétérozygote.


Accouplement de pigeons sans barres

Ce caractère étant récessif, les génotypes du mâle


et de la femelle ne peuvent être que c // c ; donc tous les jeunes seront non barrés.

Accouplement d'un pigeon non barré et d'un pigeon barré

Le pigeon barré ayant deux génotypes différents, il y a deux possibilités.



Tous les jeunes sont barrés mais hétérozygotes, porteurs du facteur c



50 % des jeunes sont barrés et hétérozygotes
50 % sont sans barres


Les résultats de ce dernier accouplement ou test-cross, prouvent que le sujet barré était porteur du facteur c alors que son phénotype ne permettait pas de le distinguer du sujet de formule + // +.

Accouplement de deux sujets barrés

Si les deux sujets ont pour génotype + // +, tous les jeunes seront barrés et purs pour ce caractère.

Si l'un des deux est hétérozygote (+ // c) tous les sujets produits seront barrés mais 50 % d'entre eux seront hétérozygotes.

Si les deux sujets sont hétérozygotes on obtient le résultat suivant :



50 % de sujets barrés hétérozygotes
25 % de sujets barrés purs
25 % de sujets non barrés purs

Si l'accouplement de deux sujets barrés donne de temps à autre un sujet sans barres, c'est la preuve que ces deux sujets sont hétérozygotes.

(à suivre)

J. FRANQUEVILLE

Les jeunes au plateau

(suite)

La qualité du pigeonneau sera directement fonction de l'état de son appareil digestif. Si l'alimentation — au sens complet du terme — conditionne directement la bonne croissance de ce jeune organisme, la qualité de l'alimentation ne jouera qu'un rôle diminué par une mauvaise assimilation si foie et intestin sont en mauvais état. « Ce qui compte, c'est ce qu'on assimile ».

C'est dire l'importance de tous ces accidents dit "digestifs" marqués surtout par l'apparition de la diarrhée. Ils peuvent être provoqués par l'alimentation elle-même : mauvaises graines (le plus souvent mal conservées) ; mélange déséquilibré, déséquilibre minéral (recherche du sel, consommation de toxiques salés — engrais — manque de grit), déséquilibre vitaminique (recherche de limaçons, de terre, de verdure), déséquilibre cellulosique. Mais ils sont le plus souvent le fait de maladies parasitaires ou microbiennes : trichomonose des premières voies digestives provoquant la soif donc le rejet d'eau en quantités excessives ; coccidiose intestinale avec épaississement de la paroi, donc diminution de la perméabilité intestinale, donc soif donc diarrhée ; microbismes divers ayant les mêmes effets ; atteintes du foie avec émission exagérée ou moindre de la bile et dérèglements dans la transformation de la ration (abcès à trichomonas, intoxications, microbismes).

Les premiers signes sont, le plus souvent la diarrhée, précédée quelquefois de constipation, l'amaigrissement (les acides aminés et les graisses passent mal, eux aussi, la paroi intestinale). Les signes suivants sont le rachitisme (bréchet dévié, os des pattes flexibles) et le plumage marqué.

Le plumage est déficient sur 2 points. Tout d'abord il y a diminution de l'apport alimentaire au follicule où pousse la jeune plume, donc moindre développement — au moins passager — de cette plume : on dit que la plume est "marquée". Ensuite l'entretien de tout le plumage se fait mal, en particulier à cause de la déficience des glandes surrénales, il y a insuffisance de production des pigments qui donnent au plumage l'intensité de sa couleur. Le principal de ces pigments est la mélanine (noire). Le plumage peu coloré, terne, presque délavé. Il faut ajouter à ce triste tableau, la somnolence, l'apathie de ces pigeon-neaux sans entrain qui sont sales et ébouriffés.

Les affections respiratoires dominent actuellement parmi les maladies des pigeons. Les adultes sont habituellement atteints de façon très discrète (coryza sec, mouvements du bec, fente palatine fermée, œil humide, "gros cou", etc...) les pigeon-neaux montrent, généralement autour du sevrage, des signes beaucoup plus nets : œil humide, bec sale et quelquefois râle. L'existence de tels symptômes doit alerter l'amateur : l'élevage c'est l'épreuve de vérité.

Chez les pigeon-neaux les affections respiratoires gagnent facilement poumons et surtout sacs aériens ou se développent des masses purulentes impossibles à éliminer : le pigeonneau devra être sacrifié.

C'est dire avec quel soin il faut détecter ces histoires et y remédier avec rapidité. L'avenir de l'élevage, celui de la colonie et la qualité de la saison en dépendent.

J.-P. STOSSKOPF,
Docteur-Vétérinaire.

LES VERS DU PIGEON

par A. DONEUX, Docteur-Vétérinaire

Chez les pigeons, les vers constituent avec les coccidies et les trichomonades, une des causes principales de mauvaise condition.

Les pigeons sont généralement infestés par deux sortes de vers : le ver capillaire et l'ascaride. Ces vers vivent dans l'intestin et se nourrissent des aliments avalés par le pigeon. Ils peuvent en outre endommager gravement l'intestin. Dans ce cas, les excréments sont clairs et visqueux, d'une coloration brune ou verte.

Symptômes de la maladie

Les animaux s'affaiblissent et maigrissent, performances de vol diminuées, soif vive, plumage terne, couvées insuffisantes.

A cause de leur faiblesse générale, les animaux sont souvent atteints par d'autres maladies, telles que la trichomoniose ou la coccidiose.

Des milliers d'œufs

Chaque ver pond quotidiennement des milliers d'œufs, qui sont rejetés avec les excréments : sur le sol, les toits, dans les nids, etc... Ces vers peuvent être picorés, après quoi ils deviennent des vers adultes qui pondent à leur tour des milliers d'œufs, etc...

Lutte prophylactique

Pour réduire au minimum les chances d'infestation, il faut observer strictement les règles suivantes :

- le pigeonnier doit être sec : les œufs de ver ne peuvent se développer dans un milieu sec.
- au moins une fois par semaine, toutes les fientes sont raclées du sol, des nids, des banquettes, etc...
- le pigeonnier tout entier (sol, nid, etc...) est régulièrement désinfecté de préférence au chaux. La plupart des désinfectants chimiques sont inefficaces pour les œufs de ver.

— éviter de répandre les graines à même le sol, les animaux peuvent en effet picorer des œufs de ver avec les graines.

— l'eau de boisson doit être renouvelée au moins une fois par jour.

Le lévamisole dans l'élevage des pigeons

Le lévamisole est un vermifuge extrêmement actif contre l'ascaride et le capillaire du pigeon. Il est présenté sous forme de pilules (20 mg de principe actif), faciles à administrer grâce à un appareil doseur.

Pendant 24 heures avant le traitement, on ne donne aucune nourriture aux pigeons.

Dose

Une pilule par pigeon. En cas d'infestation par des vers capillaires le traitement doit être répété après une semaine.

Le Spartak est bien toléré

Après le traitement, on remarque parfois un vomissement. Celui-ci n'a aucune influence sur le résultat et est inoffensif pour les animaux. Le vomissement survient plus rarement si les pigeons sont à jeun.

Mesure d'hygiène contre de nouvelles infestations

Pour éviter autant que possible la réinfestation, il faut traiter tous les pigeons, et le pigeonnier doit être nettoyé à fond.

Trois jours après le traitement on répètera cette opération, après quoi le pigeonnier sera désinfecté au chaux (à l'eau bouillante). Si on néglige ces mesures, une nouvelle infestation est inévitable. Les œufs jonchant le sol seront picorés, et au bout de trois à six semaines, on trouvera à nouveau des vers adultes chez les animaux.

Quand administrer le vermifuge

Les pigeonneaux sont déparasités deux ou trois jours avant le sevrage. Les pigeons d'agrément peuvent être déparasités à n'importe quel moment.

Les pigeons voyageurs seront déparasités régulièrement et à des périodes bien précisées :

- environ un mois avant la saison des accouplements, pour que les animaux se trouvent en excellent état au moment de la reproduction, et pour réduire au minimum les chances d'infestation des pigeonneaux

- environ un mois avant la saison des vols, pour permettre aux pigeons de produire les meilleures performances de vol
- quand une infestation est diagnostiquée, pour éviter qu'elle ne prenne de l'ampleur.

Nous tenons à exprimer toute notre gratitude à la firme Janssen Pharmaceutica, pour sa collaboration technique et pour l'accueil chaleureux qu'elle a réservé à notre demande.

Lu, vu ou entendu pour vous...

par J. FRANCQUEVILLE

Serait-il possible de connaître le sexe des pigeonneaux avant la naissance ?

C'est ce qu'affirme, dans le mensuel "American Pigeon Journal", une annonce publicitaire pour la vente d'un pendule détectant le sexe des animaux et des oiseaux même avant l'éclosion de ceux-ci.

..

Dans ce même mensuel, nous lisons que Monsieur Yul Brynner avait souvent des difficultés pour récupérer ses Rouleurs qui volaient trop haut. Les suivant en hélicoptère, il constata qu'ils montaient à une altitude de près de 3.000 m. La raison pour laquelle beaucoup de Rouleurs et Tipplers se perdaient est maintenant éclaircie.

Pour guider ses pigeons à la tombée de la nuit, par temps couvert ou par temps de brouillard, Monsieur Brynner se sert d'un rayon laser. La lumière est dirigée sur les œufs dans les nids, sur les jeunes ou sur des pigeons perchés dans le pigeonnier. Ainsi les pertes sont considérablement réduites.

..

Dans le monde magique de Walt Disney, à Lake Buena Vista, Fla. U.S.A., 400 voyageurs blancs sont lâchés tous les soirs et survolent le drapeau américain et une fanfare en marche. Les pigeons évoluent dans le ciel de Floride au-dessus du château de Cendrillon. C'est une tradition qui date de 1955 chez Walt Disney.

..

Pigeons voyageurs utiles à la médecine.

Des pigeons transportant de petites fioles incassables ont été lâchés d'un hôpital de Plymouth dans le sud de l'Angleterre et sont retournés à un laboratoire proche. Ce nouveau mode de transport pourrait économiser du temps et de l'argent. Si cela se révèle intéressant, les autorités projettent d'installer des pigeonniers près d'une douzaine d'hôpitaux de la région, pour éviter d'avoir recours à des taxis et pour gagner du temps lorsque les analyses sont urgentes.

..

Normalement, il y a 10 rémiges primaires chez le pigeon (celles de l'extrémité de l'aile) mais ce nombre peut varier, assez rarement, il est vrai.

On a remarqué seulement 9 rémiges primaires chez des culbutants à face courte ainsi que 11, moins rarement, chez certains culbutants, Carneaux, voyageurs, etc... Il m'est arrivé de juger un Carneau ayant 11 rémiges primaires ; il paraissait un peu trop long.

Ces caprices de la nature suscitent une vive polémique chez les éleveurs américains, anglais et allemands.

Des éleveurs expérimentés pensent que les qualités principales, chez les culbutants à face courte, sont la forme de la tête et du bec, le type, le dessin et que le nombre de rémiges, 9 ou 10, est moins important. Certes, à qualité égale, l'oiseau ayant 10 rémiges primaires sera préféré, surtout si celles-ci doivent être blanches.

D'après l'auteur d'un article sur ce sujet, dans une exposition allemande comptant 700 culbutants à visage court, 95 % des sujets qui étaient d'ailleurs de très bonne qualité, n'avaient que 9 rémiges primaires.

..

Le problème des coquilles faibles ou des œufs sans coquille (extrait de "American Pigeon Journal").

Il y a un certain nombre de raisons pour que des femelles pondent des œufs sans coquille ou des œufs à coquille trop fine. La plus commune est une carence de l'alimentation en calcium. Dans ce cas, le remède consiste à donner un composé minéral convenable dans une mangeoire réservée à cet effet et administrer à ces femelles des comprimés de minéraux quelques jours avant la ponte.

Mais la cause ne provient pas toujours de l'alimentation. Si une femelle pond des œufs à coquille trop fine, ceux-ci sont généralement cassés dans les jours qui suivent. Il est inutile de les laisser, dès qu'on s'en aperçoit. Il vaut mieux les remplacer par d'autres œufs ou des œufs factices qui permettront à la femelle de se reposer pendant qu'elle couvera.

L'auteur de l'article rapporte que plusieurs de ses collègues-éleveurs donnaient du bicarbonate de soude dans l'eau de boisson à de telles femelles ainsi qu'à des dindes. Certes, il n'y a pas de calcium dans le bicarbonate de soude, remarque-t-il, il n'en est pas moins vrai que ce traitement résolvait le problème en peu de temps. Notre auteur s'est donc adressé à des gens compétents pour comprendre comment pouvait agir le bicarbonate de soude dans ce cas précis. Les expériences furent faites en ajoutant du bicarbonate de soude à la nourriture, pas à l'eau de boisson. Dans l'eau de boisson, le produit change de forme trop vite et les oiseaux n'en tirent pas le même bénéfice que s'il était ajouté à la nourriture.

Lorsqu'il est passé dans le sang, il élève son PH, en d'autres termes, il le rend plus alcalin. Il agit en aidant l'assimilation du calcium. Des femelles qui recevaient assez de calcium dans leur ration pondaient des œufs à coquilles faibles parce que leur organisme ne pouvait pas l'utiliser. Le bicarbonate de soude facilite cette opération et il en résulte des œufs à coquille normale.

On peut se poser la question suivante : « Quelle quantité utiliser ? ». L'article ne le précise pas mais suggère aux éleveurs intéressés d'expérimenter de petites quantités d'abord puis d'augmenter les doses jusqu'à ce que le résultat voulu soit observé. En donner trop pourrait gêner la digestion ou d'autres fonctions. On peut essayer de donner de petites doses, au bec, seulement aux femelles handicapées.

..

L'écologie et les grandes villes.

Certains amateurs d'élevage habitant dans un quartier résidentiel se heurtent à des interdictions qu'ils ne peuvent enfreindre.

La municipalité de Brok Haven, près de New York, a résolu ce problème en promulguant à l'unanimité

un texte de loi qui permet l'élevage près des habitations, à certaines conditions : Paiement d'une taxe - Construction de pigeonniers esthétiques - Propreté minutieuse, absence d'odeurs - Réglementation du nombre de sujets élevés : 1 pigeon pour 0,9 m², etc...

Cette réglementation, si draconienne qu'elle soit, constitue quand même un progrès.

Au cours de l'Assemblée Générale de la C.N.A.F., nous avons appris qu'en Allemagne une solution diffé-

rente avait été adoptée par certaines villes : La municipalité met un terrain à la disposition des éleveurs qui doivent réaliser des constructions satisfaisant à l'esthétique. Bien entendu, les installations doivent être propres. Il est souhaité qu'elles soient agrémentées d'arbustes et de fleurs. On ne peut habiter dans le secteur qui est réservé à l'élevage uniquement. Le Président Wiltzer, qui a visité l'une de ces installations, souhaiterait en voir de semblables en France.

Entraînement des Haut-Volants et du Tippler en particulier (suite)


Quand vous avez trois Tipplers de qualité : les concours se font avec trois et au maximum vingt Tipplers ; il est facile de comprendre qu'il est plus facile de trouver trois bons Tipplers que vingt, et trois font moins de fautes que vingt. Nous mettons ces champions en boxes. Nourriture, pareille le soir, vue du Dropper ; mais nourriture dans les boxes et à boire après. Vous pourrez contrôler chaque pigeon et ce qu'il mange. Peser la ration et vérifier les fientes. Lâcher tous les trois jours. Il y a de fortes chances que vos Tipplers voleront entre 7 et 8 heures sans se poser. Durant toute la préparation et de même plus tard quand les Tipplers sont en boxes ils doivent recevoir régulièrement de la verdure et des sels minéraux. Le grit doit toujours être dans le pigeonnier. Pour que vos pigeons puissent prendre régulièrement le grit, laissez les de temps en temps après le vol en liberté dans le pigeonnier avant de les remettre en boxes.

Nous voulons concourir à un concours. Nous allons donc préparer nos Tipplers afin qu'ils donnent le maximum. Pour les autres Haut-Volants et Culbutants la méthode est identique à part que la nourriture est moins pauvre au début. Chez le Tippler c'est la durée de vol qui compte et non la hauteur. Le record du monde appartient à Jack Boden du "Handsworth Flying Tippler Club" - Birmingham - Grande Bretagne, avec 20 heures et 40 minutes. Le record d'Allemagne appartient à Olaf Ullrich de Hambourg avec 18 heures et 10 minutes. A côté de ces gens je me sens tout petit avec mes 10 heures 32 minutes réussies le 26 Juin 1975. Pour obtenir de tels résultats nos collègues anglais habituent leurs Tipplers à se poser dans la nuit ; toujours plus tard et pour ce faire ils ont un éclairage spécial sur le toit. Les pigeons réagissent à la lumière et au Dropper, les deux étant liés.

Notre trio sélectionné pour le ou les concours suivra donc un entraînement tous les trois jours, par n'importe quel temps car nous ne savons pas le temps qu'il fera le jour du concours. Le gros pourcentage d'orge que nous donnons à nos athlètes permet de les avoir en petite condition et malgré cela de les faire voler assez longtemps. Il faut donc les amener au maximum de leur condition physique pour le jour du concours. Il faut donc trois semaines avant le concours, trouver la quantité de nourriture minimale avec laquelle nos pigeons volent néanmoins bien. Pour cela l'orge pure sera excellente. Si nous nous apercevons qu'avec l'orge pure ils ne volent pas assez ajoutons un peu de blé. Sur l'orge pure le trio doit voler environ trois heures tous les trois jours. Ce régime d'orge pure nous le maintenons environ quatorze jours. Les jours avant le vol, nous leur donnons avant la ration d'orge une cuillerée à café de mélange canaris ; également quelques graines du mélange sport. Il ne faudrait pas que au moment où nous améliorons la nourriture les pigeons refusent celle-ci car ils ne connaissent pas ces graines. Prenez tous les jours les pigeons en main ; ils doivent être légers et donner une impression de maigreur. Un pigeon de sport se met en condition optimale en général en l'espace de cinq à sept jours de bonne nourriture. Quand nous passons du régime orge à un plus riche il est bon de donner dans l'eau de boisson une cuillerée à café pour 3/4 de litre d'eau de Bicarbonate de soude. Les aliments séjournent de 12 à 14 heures dans le corps du pigeon avant d'être éjectés comme fientes. Nous arrivons à la dernière semaine avant le concours. Le premier soir nous réduisons la ration en quantité à 80 % de ce qu'ils mangent d'habitude. Nous donnons 50 % d'orge et 50 % de blé, et de l'eau avec bicarbonate de soude, comme décrit. Trois jours après ce régime, toujours 80 % de la ration ; nous donnons 50 % de pois et 50 % de blé. Puis eau avec bicarbonate. Ce repas est donc après le vol. Le lendemain les pigeons n'ont pas de volée et le soir à nouveau 50 % de pois et 50 % de blé. En les prenant en main vous serez surpris du poids qu'ils ont pris en si peu de temps. On peut penser qu'ils sont capables de voler environ 8 heures ; le lendemain donc, volée. On les laisse voler six heures avant la nuit et on les fait rentrer au bout de cinq heures. Ils ne doivent pas encore donner toutes leurs forces. En les prenant en main

après le vol, ils ne doivent pas avoir perdu de poids ou très peu.

Le soir nourriture : 50 % de pois et 50 % de mélange canaris. Il ne reste plus que deux jours avant le concours. Pour que les pigeons restent tranquilles de jour on obscurcit les cases durant la journée. Le soir à nouveau 50 % de pois et 50 % de mélange canaris. Ensuite eau pure. Douze à quatorze heures avant le lâcher officiel on nourrit à 50 % de petit maïs (perlé) et 50 % de mélange canaris. Une demi-heure après boisson : eau pure. Environ deux heures avant le lâcher on redonne à boire. En prenant les pigeons en main vous verrez que vos pigeons sont de véritables paquets de muscles. Le résultat du vol devrait être, si le temps le permet, de qualité. Ceci est la méthode idéale pour le Tippler. Il est normal qu'une autre race de Haut-Volants et de Culbutants qui volent d'habitude dans les deux heures, peut par cette méthode sérieusement améliorer ses performances. Après le concours les Tipplers sont en général très maigres, ils ont mangé toutes les réserves. Il est recommandé de les laisser en liberté dans le pigeonnier sans leur donner la volée durant une semaine. Nourriture : mélange sport coupé à 50 % d'orge. Après cette semaine on recommence le régime de l'orge pure. Les concours de Tipplers se suivent toutes les quatre semaines.



Femelle Tippler mosaïque. Comme jeune, a volé 13 h.
Éleveur : Tom Zeechinor (Pays de Galles).
Propriétaire : H. Kaupschäfer - Dorsten - Allemagne

Pour des pigeons adultes la méthode est la même à part qu'en automne on connaît bien ses pigeons ; la sélection est faite. Il faut donc garder une équipe pour le sport de préférence du même sexe. Je préconise les mâles ; car les femelles si elles sont aussi bonnes au vol que les mâles, ont tendance à pondre quand elles reçoivent une nourriture plus excitante, et perdent ainsi leur bonne condition. Des adultes sont à mettre en boxes dès le mois de Janvier. Ils s'habituent ainsi bien à ce mode de vie et deviennent très familiers avec leur manger. En principe on ne lâche les pigeons en hiver que quand on est certain du temps. Si vous gardez une équipe de mâles il est bon d'avoir comme Dropper une femelle.

Les boxes sont à nettoyer tous les jours. Certains éleveurs ont des boxes avec un fond grillagé ; cette méthode, si elle évite bien du travail, a l'inconvénient de ne pas permettre de contrôler les fientes. Dans une équipe de vol il doit y avoir des pigeons du même type ayant un style de vol identique. Bien souvent une bonne équipe est composée de pigeons qui sont frères ou cousins.

Schéma d'une méthode d'alimentation pour Tipplers (dernière semaine)

- 1^{er} jour au soir : 50 % orge, 50 % blé, après une heure, eau avec bicarbonate.
- 2^e jour au soir : 50 % blé, 50 % mélange canaris, après une heure, eau pure.
- 3^e jour au soir : Vers le soir 4 à 5 heures de vol. Une heure après : 50 % de blé, 50 % de pois. Une heure après, eau.
- 4^e jour au soir : 100 % pois, une heure après boisson.
- 5^e jour au soir : Vers le soir 6 heures de vol. Une heure après 25 % de blé, 75 % de pois. Une heure après eau.
- 6^e jour au soir : Matin 2 cuillerées à café de mélange canaris puis eau. Soir 25 % de maïs, 25 % de blé, 25 % de graines de lin, 25 % de pois. Une heure après boisson.

7^e jour au soir : Matin 2 cuillerées de mélange canaris, eau. Soir 12 à 14 heures avant le vol : 50 % de maïs, 50 % de mélange canaris. Une demi-heure après, eau.

8^e jour au soir : Une heure avant le lâcher eau pure.

Pour les autres Haut-Volants, il faut dire que ce sont les pigeons adultes qui sont les meilleurs au haut vol.

En matière de nourriture. Après que les reproducteurs ont élevé deux couvées on sépare les sexes. Vol tous les jours à la même heure, nourriture très légère, une demi-heure après le vol. Le soir nourriture : mélange sport mais juste ce qu'il faut. Le jour du concours s'inspire de la méthode décrite ci-dessus et le dernier repas avec pas mal de mélange canaris.

Raymond KNAUB

QUESTIONS RÉPONSES QUESTIONS RÉPONSES QUESTIONS

par J. FRANCQUEVILLE

QUESTION :

- 1) J'ai acheté une très belle femelle Cauchois jaune et l'ai accouplée ; depuis 8 mois, elle va au nid mais n'a pas pondu. Que dois-je faire (Le mâle a déjà eu des petits).
- 2) Comment faire pour que les jeunes Cauchois jaunes aient une belle couleur. Comment accoupler

RÉPONSE :

- 1) La stérilité peut avoir des causes diverses :
 - maladie microbienne atteignant l'appareil génital (paratyphose, par exemple). Les lésions sont parfois irréversibles et les sujets même guéris ne peuvent plus procréer.
 - séquelles d'un accident de ponte
 - forte infestation par les vers intestinaux
 - dérèglement hormonal
 - trop grande jeunesse, ou vieillesse.

Il faut faire les traitements et vaccinations appropriés, et patienter quelques mois ; si cette femelle Cauchois est née en 1976 il y a encore un peu d'espoir de la voir pondre. Si elle est plus âgée, je crains que ce soit un sujet stérile qui ne pondra jamais, ou très rarement.

2) Pour obtenir des Cauchois d'un jaune intense, il faut avoir recours à l'accouplement maillé jaune × maillé rouge ou barré jaune × barré rouge, dans un sens ou dans l'autre. L'accouplement mâle jaune × femelle rouge est autosexable (on obtient des femelles jaunes et des mâles rouges hétérozygotes). L'accouplement mâle rouge × femelle jaune, si le mâle est pur, donne tous sujets rouges, si le mâle est hétérozygote, des jaunes et des rouges. Le mâle rouge hétérozygote permet ainsi, accouplé avec une femelle jaune, d'avoir généralement des sujets d'un beau jaune. Bien entendu, pour rehausser la couleur jaune, il ne faut pas utiliser de sujets d'un rouge terne, mais au contraire, des sujets bien teintés.

Le dernier accouplement cité donne :

- 1/4 de mâles rouges hétérozygotes
- 1/4 de mâles jaunes
- 1/4 de femelles rouges
- 1/4 de femelles jaunes.

Il faut utiliser des sujets dont le liseré noir des plumes du bouclier est assez fin.

QUESTION :

Depuis quelques temps, j'ai des ennuis avec mes pigeons. En voici les symptômes. Lorsqu'ils ont environ 3 semaines, ils sont gênés pour respirer. Ils respirent le bec ouvert, leur nez coule, ils maigrissent et meurent. Je leur fais deux piqûres d'anti-coryza. Avec ce traitement ils se guérissent, mais lorsqu'ils ont des jeunes ils sont malades à leur tour. Que me conseillez-vous ?

RÉPONSE :

Lorsque des pigeons ont du coryza, il ne suffit pas de faire des piqûres d'antibiotiques (anti coryza), il faut aussi combattre la coccidiose et la trichomonose dont ces pigeons sont probablement atteints.

Il existe de bons produits contre ces maladies chez tous les vétérinaires.

Pour que les pigeons n'aient pas de rechute quelques mois après ou l'année suivante, il faut combattre régulièrement coccidiose et trichomonose. Le sol doit être parfaitement sec, le sable ou la litière fréquemment renouvelé. On peut y épandre du superphosphate de chaux en poudre pour diminuer les risques de rechute.

Un bon composé minéral vitaminisé, à la disposition des pigeons est un facteur de bonne santé.

QUESTION :

Je possède cinq couples de Strassers bleus et de Mondains qui ont par deux fois consécutives eu des oeufs clairs. Cela ne s'était jamais produit dans mon élevage. L'article

paru en page 11 du Bulletin de Janvier ne me satisfait pas pleinement. Dans le midi de la France, les jours sont assez longs et le froid intense ne règne pas ; de plus, mon pigeonnier, je crois, possède assez de luminosité. J'effectue régulièrement les traitements contre les vers, les maladies respiratoires, la trichomonose. Je donne à mes pigeons : du blé, du maïs, des pois jarrais, de la vesce, du grüt et des coquilles d'huîtres. Les autres couples élèvent actuellement leurs nichées qui paraissent en bonne santé.

RÉPONSE :

Il est assez fréquent que des pigeons aient des oeufs clairs en janvier ou février ; l'article que vous mentionnez le signale. Même dans votre région, les jours sont plus courts en cette saison. D'autre part, d'une année à l'autre les conditions climatiques ne sont pas les mêmes et il est possible que les pigeons en subissent le contre-coup même si cela passe inaperçu pour l'éleveur.

En bavardant avec quelques éleveurs, j'ai entendu dire que beaucoup d'oeufs étaient clairs, cet hiver. Les races lourdes sont, bien sûr, les plus touchées et parmi elles, certains sujets sont plus sensibles.

Peut-être qu'une cure de vitamines serait bénéfique. Un bon composé minéral vitaminisé aide à résoudre bien des problèmes en maintenant les pigeons en bonne santé.

QUESTION :

J'ai un couple de Strassers bleus bagués 75 qui m'a donné très peu de jeunes, de mai à février (oeufs clairs, pigeons morts en coquille, pigeons qui meurent à l'âge de quelques jours).

Ils ont été vermifugés.

Par ailleurs, un couple de Sottobancas qui a élevé 13 petits l'an dernier, a expulsé du nid, 4 petits, cette année. Ces jeunes n'étaient pas morts. Après les avoir réchauffés, je les ai ramenés à la vie mais le lendemain ils étaient encore hors du nid et morts, cette fois.

RÉPONSE :

Il est possible que la mort des jeunes dans la coquille ait pour cause la faiblesse due à un manque de vitamines ou un manque d'iode (quelques gouttes par litre d'eau de boisson). Un bon concentré minéral vitaminisé en contient. Par exemple : Vitaminéral de chez "Natural France", 1, rue de l'Agrippin, 59 Wambrechies. Ils ont des délégués dans toute la France.

On peut aussi supposer que vos pigeons ne produisent pas beaucoup de lait de jabot. Veuillez vous assurer si les petits qui meurent à 2 jours ont le jabot plein d'une bouillie jaunâtre ou plein d'eau. Certains sujets ne produisent pas beaucoup de lait et sont donc de mauvais nourriciers. Je vous suggère de séparer votre couple et d'accomplir chaque sujet avec un autre conjoint. Vous découvrirez celui qui n'élève pas bien.

Vos pigeons sont peut-être porteurs d'un gène facteur létal (facteur qui provoque la mort à un moment donné, dans l'oeuf ou plus tard). La séparation du couple pourrait être une solution.

Votre couple de Sottobancas est trop pressé ; ne donnez-vous pas une nourriture trop riche en protéines ? Ont-ils deux nids à leur disposition ? Ce comportement est parfois le résultat d'un dérèglement hormonal. Là aussi, la séparation serait une solution qui permettrait de découvrir le fautif.

Surveillez aussi l'état des fientes des jeunes ; elles doivent être rondes de préférence et surtout fermes. Si elles sont liquides, on peut penser à la coccidiose qui provoque souvent la mort des jeunes quand ils commencent à s'emplumer.

QUESTION :

J'ai acheté un couple de Mondains bagués 76 à deux éleveurs différents, en août 76. Depuis un mois environ,

la femelle est toujours sur le nid, donnant l'impression de couvrir et depuis quelques jours, le mâle va prendre le relai, comme s'il y avait des oeufs. Que peut-on faire ?

RÉPONSE :

Il semble que votre femelle Mondain soit peu productive ou peut-être stérile. Je vous suggère de la séparer du mâle pendant une quinzaine de jours et de lui donner une nourriture peu abondante — elle est peut-être trop grasse — et des vitamines. Un bon composé minéral vitaminé lui serait bénéfique.

Lorsque vous les remettrez en présence, leur ardeur se réveillera et comme c'est l'accouplement qui déclenche la ponte de la femelle, il est possible que le résultat ne se fasse alors pas trop attendre. Si elle n'a pas pondu avant juin, sa carrière est compromise.

QUESTION :

1) J'ai lu sur un livre concernant l'élevage du Carneau qu'il était très batailleur, est-ce vrai ?

2) J'aimerais avoir un couple de Boulants mais je ne sais pas s'ils peuvent être mélangés avec des Mondains et des Texans auto-sexables.

RÉPONSE :

Tout d'abord je tiens à préciser que le Carneau n'est pas plus batailleur que la plupart des races moyennes. Comme n'importe quel pigeon, il défend sa case.

On éprouve quelques ennuis, avec toutes les races de pigeons, au début de l'année, lorsqu'on introduit de nouveaux couples dans un pigeonnier. Il suffit d'exercer une surveillance attentive lorsqu'on ouvre la case des nouveaux-venus et de remettre chacun à sa place, le cas échéant, lorsque les pigeons ne parviennent pas à retrouver leur case.

J'ai 20 couples de Carneaux dans une volière ; en cours d'année, il y a très rarement des batailles ; cela n'arrive que lorsque j'introduis un nouveau couple.

Certaines races de boulants défendent mal leur case car ils sont fortement gênés par leur boule. Il est donc préférable de ne pas les mélanger à d'autres races.

QUESTION :

J'habite le Haut Jura où l'hiver est long et rigoureux. J'aimerais me spécialiser dans les races auto-sexables Texan ou King. Pourriez-vous me dire si le climat conviendrait à ces races ou plus particulièrement à une autre race de rapport que vous voudriez bien m'indiquer. Mon pigeonnier est situé dans une ancienne ferme, exposé au nord ; le vent froid est dominant. Je ne possède que des races croisées locales. Si je veux faire du pigeon de race, tenant à mettre toutes les chances de succès de mon côté, ne dois-je pas faire un pigeonnier exposé sud-est,

et supprimer mes couples ou du moins ne pas les mélanger ?

RÉPONSE :

Les pigeons, quelle que soit leur race, s'acclimatent assez facilement partout, pourvu que leur habitation soit saine. Ils ne craignent pas le froid mais plutôt les grandes chaleurs. C'est surtout l'humidité qu'il faut éviter. C'est pourquoi l'exposition au nord n'est pas convenable. Le soleil ne peut pas pénétrer dans votre pigeonnier et les pigeons en ont besoin. Si l'aération est bonne, il est possible que vous réussissiez quand même. Le manque d'ensoleillement est également à craindre.

Vous n'êtes pas obligé de supprimer vos pigeons bâtards, s'ils vous donnent satisfaction et s'il n'y a pas surpeuplement. Avec un nombre accru de pigeons, on multiplie les risques d'épidémie, donc pas de surcharge. D'autre part, si vos pigeons auto-sexables s'accouplent avec des bâtards, les pigeonneaux ne seront plus auto-sexables. (Il y a souvent des infidélités, chez les pigeons). Il vaudrait mieux séparer les races, à moins que vous ne désiriez seulement produire des pigeonneaux de consommation.

QUESTION :

J'envisage d'aménager une partie de grange de façon à créer un local de 6 m x 2 et de 2,5 m de haut donnant accès sur une volière couverte.

Quant à la construction de la volière orientée sud-est, je ne sais si je dois construire des murs sur les côtés ou poser du grillage.

Les séparations doivent-elles être simplement en grillage ou bien pleines (bois ou brique).

RÉPONSE :

Si vous désirez que le sol de votre volière reste bien sec (béton couvert de sable, par exemple) il est préférable de l'abriter des intempéries de chaque côté et de prévoir un toit qui s'avance suffisamment pour qu'une pluie battante ne puisse pas pénétrer.

Il y a une solution plus simple : le pigeonnier proprement dit pourrait être plus profond, 3 m 50 par exemple et au lieu de faire une volière couverte, vous pourriez fixer un balcon entièrement grillagé, même le bas, où les pigeons pourraient profiter du soleil et de la pluie, sans risques. Le balcon peut s'étendre devant la façade de tout le pigeonnier. Hauteur : 0,80 m à 1 m, par exemple, profondeur : égale à la longueur de votre bras, pour pouvoir attraper les pigeons.

Vous pouvez faire des séparations grillagées, à moins que vous ne désiriez, en hiver, séparer les mâles des femelles ; il est préférable qu'ils ne se voient pas. Il vaut mieux, dans ce cas, que les séparations soient en bois, pour absorber l'humidité.

Il est souhaitable que les questions qu'on me pose soient précises et accompagnées de renseignements complémentaires (habitat, nourriture, état sanitaire de l'ensemble des pigeons, etc...).

Je signale à l'attention de mes correspondants que je ne vends pas de documentation comme certains l'ont cru. Je suis éleveuse amateur depuis une trentaine d'années, en aucune façon une commerçante. Il en est de même pour toute l'équipe dirigeant la S.N.C. qui œuvre **bénévolement** pour le développement de la Colombiculture française, sans aucune arrière-pensée mercantile.


L'élevage du pigeon doit être considéré comme une **forme de loisir noble** ; nous désirons donner à nos lecteurs toute l'information nécessaire pour bien le pratiquer.

C'est donc avec le plus grand plaisir que je réponds à vos questions dont certaines sont très intéressantes, dans la mesure de mes possibilités.

Pour toute question nécessitant une réponse personnelle, prière de joindre une enveloppe timbrée.

J. FRANQUEVILLE





Couple de Bagadai de Nuremberg
P.H. à Juan-les-Pins 1976 - Propriétaire : M. Vissian
(Photo Ebner)



Couple de Cravatés Chinois
P.H. à Juan-les-Pins 1976 - Propriétaire : M. Guillemot
(Photo Ebner)

LES EXPOSITIONS

Antibes - Juan-les-Pins (24-28 Novembre 1976)

Grand Prix de l'Exposition :
n° 159-160, Parquet de Mondains à M. Cassar
Grand Prix d'Honneur :
n° 276, Strasser à M. Escarboutel
n° 415, Tambour de Boukharie à M. Guillemot Y.

Guéret (26-27 Mars 1977)

Grand Prix d'Honneur :
n° 262, Bagadai à M. Holubec
n° 536, Lynx de Pologne à M. Holubec
n° 685, Boulant de Norwich à M. Jean.

Rouen (25-27 Mars 1977)

Grand Prix de l'Exposition :
n° 714, Mondain à M. Chicot
Grand Prix d'Honneur :
n° 931, Strasser à M. Boulter
n° 999, Boulant de Saxe à M. Rouxel

Grands Prix d'Excellence :

n° 518, Carneau à M. Hartel Julien
n° 898, Renaisien à M. Mésenge
n° 418, Capucin à M. Eguluz

Coupe meilleure présentation :

M. Becquet (Carneaux)
M. Lequertier (Cauchois)
M. Chicot (Mondains)
M. Boulter (Strasser).

Brignoles (26 Mars - 3 Avril 1977)

Grand Prix de l'Exposition :
n° 38, Couple de Mondains à M. Bianchimani
G.P.H. (couples) :
n° 129, Voyageurs allemands à M. Ripaldi
n° 165, Frisés Hongrois à M. Guladeur



Voyageurs Allemands
Type Beauté
papillotés
n° 192 à M. Ripaldi Robert
Couple G.P.H.
(Juge : G. Raiek)
(Photo P. Vissian)



Mâle Schietti papilloté
n° 182 à M. Ciccullo André
G.P.H. (Juge : G. Raiek)
(Photo P. Vissian)

Photos Exposition de Brignoles

G.P.H. (unités) :

n° 23, Cauchois à M. Thévenin
n° 107, King à M. Reillat
n° 182, Schietti à M. Ciccullo.

Aigre (20-24 Avril 1977)

Grand Prix d'Honneur :
n° 910, Alouette de Cobourg à M. Ortigé
n° 975, Boulant Allemand à M. Gervais
n° 509, Couple de Mondains à M. Lechat.

Stenay (1^{er} Mai 1977)

Grand Prix de l'Exposition :
n° 442, Couple de Cauchois à M. Cielas
Grand Prix d'Honneur :
n° 642, Couple de Strassers à M. Coudurier
n° 615, Couple de Frisés Hongrois à M. Sauvage.

Ruffec (19-22 Mai 1977)

Grand Prix de la Foire-Exposition :
n° 266, Mondain à M. Ortigé
Grand Prix d'Honneur :
n° 279, Mondain à M. Fély
n° 419, Pie Moderne à M. Dupras
n° 156, Cauchois à M. Roux
n° 388, Capucin à M. Gervais.

Complègne (28 Mai - 5 Juin 1977)

Grand Prix d'Honneur :
n° 802, Mondain à M. Chicot
n° 1838, Renaisien à M. Gorry
n° 1001, Boulant de Poméranie à M. Finot.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DU CAPUCIN

Rouen (25-27 Mars 1977)

Classement individuel :

1^{er} n° 418 M. Eguluz
2^e n° 469 M. Eguluz
3^e n° 455 M. Leclerc
4^e n° 445 M. Eguluz
5^e n° 451 M. Eguluz
6^e n° 436 M. Leprovost

Classement général :

1^{er} M. Eguluz (58 points)
2^e M. Leprovost (36 points)
3^e M. Elliot (34 points)
4^e M. Leclerc (16 points)
5^e M. Quibel (14 points)

**LE PIGEON-CLUB COTE D'AZUR
A L'EXPOSITION INTERNATIONALE D'AVICULTURE
DE SOMBOR (Yougoslavie)
15-16 Janvier 1977**

Cette Exposition rassemblait plus de 2.000 pigeons, 100 lapins et 200 volailles.

Pour la 1^{re} fois, la France participait à cette manifestation, car le Pigeon-Club Côte d'Azur y présentait 50 pigeons appartenant à 14 de ses membres.

Participaient également à cette Exposition la Hongrie, la Roumanie et la Pologne avec chacune un contingent d'environ 200 sujets.

Les sujets présentés étaient en grande majorité des pigeons de fantaisie.

Il fut attribué un titre de Champion à M. Guillemot en Cauchois, M. Ebner en Schietti, M. Vissian en Bagadais français.



Pigeons géants Hongrois (Photo P. Vissian)

LE COIN DU TRÉSORIER

La cotisation 1977 est de 40 francs, ceci dit pour vous qui avez un ami, un voisin, une relation qui désirerait faire partie de notre Société.

Les bagues se vendent, il n'est pas inutile de le redire, 6 francs la dizaine indivisible et le paiement se fait à la commande par chèque bancaire ou postal et dans ce dernier cas pour ne pas perdre de temps, si vous vous y prenez un peu tard pour les commander, faites-moi parvenir les 3 volets ; vous y perdrez un timbre mais vous serez bien plus vite servi.

Le numéro de chèque postal 22.04.40 Paris est au nom de la Société Nationale de Colombiculture et non à mon nom personnel.

Mon adresse : Monsieur Georges TANCHOU
76, rue Alexandre Ribot
59510 Hem.

Lorsque vous recevrez ce bulletin, les bagues B

seront sans doute épuisées et les autres diamètres ne seront pas toujours disponibles car nous n'en ferons plus refaire cette année ; prévoyez vos besoins le plus vite possible mais, comme chaque année, je ferai pour le mieux pour vous satisfaire et si je ne le peux je vous retournerai les fonds dans les jours qui suivent.

..

Nous faisons remarquer à nos adhérents que les bagues fournies par la S.N.C. ne doivent pas servir pour les pigeons voyageurs utilisés dans le sport colombophile.

Par contre, dans le domaine de la colombiculture, il existe le voyageur allemand d'exposition ou voyageur type beauté qui peut être bagué S.N.C.

Ajoutons que la loi interdit de mélanger dans le même pigeonnier des voyageurs ordinaires avec toute autre race de pigeons.

Les Clubs

PIGEON CAPUCIN CLUB

20 bis, boulevard des Ormes
91210 DRAVEIL

CARNEAU CLUB FRANÇAIS

19, rue du Moulin
ABBÉCOURT 02300 CHAUNY

CLUB FRANÇAIS DU CAUCHOIS

52, rue Thuret
94240 L'HAY-LES-ROSES

MODÈNE CLUB FRANÇAIS

50, avenue de l'Est
94100 SAINT-MAUR

PIGEON CLUB COTE D'AZUR

Siège Social : Vieux Chemin de Vallauris
06160 JUAN-LES-PINS

CLUB FRANÇAIS DE PIGEONS CULBUTANTS ET HAUT VOLANTS

24, rue des Pommes
67200 ECKBOLSHIEM

CLUB FRANÇAIS DU BOUVREUIL

M. Jean Passerieux - École de garçons
77820 CHATELET-EN-BRIE

CLUB FRANÇAIS DU MONTAUBAN

17, rue du Temple
33000 BORDEAUX

ROMAIN CLUB FRANÇAIS

E.M.P., Rue de Vigne
21140 SEMUR-EN-AUXOIS

SOTTOBANCA CLUB FRANÇAIS

37, rue Joseph Marignac
St-MARTIN-du-TOUCH 31300 TOULOUSE

ROUBAISIEEN CLUB FRANÇAIS

74, rue Albert Thomas
59100 ROUBAIX

CLUB FRANÇAIS

DU PIGEON HUPPÉ DE SOULTZ

Siège Social : 17, route de Wintershouse
67500 HAGUENAU

CLUB DU MONDAIN FRANÇAIS

M. Gérard Binier - 7, rue des Noyers
77000 MELUN

CLUB DU QUEUE DE PAON

M. R. Jean - 38, rue Biron
24000 PERIGUEUX

ORIENTAL-CLUB DE FRANCE

26, rue Brauhauban
65000 TARBES

LES AMIS DU MONDAIN

M. A. Seigné - 44, Lotissement du Lac
31130 FLOURENS par BALMA

CALENDRIER DES PROCHAINES EXPOSITIONS

BRIVE-LA-GAILLARDE	: 25 - 28 Août • EXPOSITION NATIONALE M. R. BUCHEZ — 8 bis, av. Michel Labrousse — 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
LA CAPELLE	: 2 - 4 Septembre • EXPOSITION NATIONALE M. A. CABARET — 3, place de la Mairie — 02480 JUSSY
CABOURG	: 2 - 4 Septembre • 2 ^e EXPOSITION NATIONALE M. J. HERBLAND — Ecole de Bellengreville — 14370 ARGENCES
MONTBARD	: 2 - 4 Septembre • EXPOSITION NATIONALE M. CHASTANG — Route d'Avallon — 21460 EPOISSES
CANDÉ	: 3 - 5 Septembre • 31 ^e EXPOSITION NATIONALE M. J.-P. LEPONT — Rue du Four — 49440 CANDÉ
CHATELLERAULT	: 3 - 11 Septembre • EXPOSITION NATIONALE M. DOUSSELIN — CHALERME — 86200 ANTRAN
MANTES LA JOLIE	: 10 - 18 Septembre • SALON D'AUTOMNE Commissariat Général — 34, rue de Lille — 75007 PARIS
AURILLAC	: 14 - 18 Septembre • 5 ^e EXPOSITION NATIONALE M. CESSAC — 10, Cité du Val d'Auze — 15540 ST-PAUL-DES-LANDES
SEDAN	: 16 - 1 ^{er} Septembre • 9 ^e EXPOSITION NATIONALE M. FILLOUX — DAIGNY — 08140 DOUZY
LOMME	: 16 - 18 Septembre • 3 ^e EXPOSITION INTERNATIONALE Championnat de France du Combattant Nain M. VERPLANCKE — 160, av. de la République — 59160 LOMME
PARTHENAY	: 23 - 25 Septembre • EXPOSITION NATIONALE Spéciale Volailles Races Françaises et Championnat d'Élevage du Blanc du Bouscat Mme BERNARDEAU — La Paillerie — Châtillon-s/Thouet — 79200 PARTHENAY
MONTAUBAN	: 29 Septembre - 2 Octobre • 23 ^e EXPOSITION INTERNATIONALE M. POURRAT — 14, rue de la République — 82000 MONTAUBAN
HAGUENAU	: 8 - 9 Octobre • EXPOSITION RÉGIONALE DE COLOMBICULTURE M. KIRSCHHOFFER — 23, Mare aux Canards — 67500 HAGUENAU
SAINT-OMER	: 8 - 9 Octobre • 1 ^{re} EXPOSITION M. RAMOLEUX — 3, rue des Fleurs — 62500 ST-MARTIN-AU-LAERT
CASTRES	: 12 - 16 Octobre • EXPOSITION NATIONALE M. MAGNÉ — 66, avenue d'Albi — 81100 CASTRES
CAMBRAI	: 14 - 16 Octobre • EXPOSITION NATIONALE Mme LAFOLIE — 14, Digue de l'Escout — 59400 CAMBRAI
ST-AMAND - MONTROND	: 15 - 17 Octobre • EXPOSITION NATIONALE Melle BAILLY Denise — ORCENAI — 18200 ST-AMAND
NANCY	: 21 - 23 Octobre • EXPOSITION INTERNATIONALE M. A. FINOT — 43, rue C. Keller — 54000 NANCY
NEVERS	: 20 - 23 Octobre • 50 ^e EXPOSITION NATIONALE M. J. COMBÉMOREL — Cours les Barres — 18320 JOUET-SUR-L'AUBOIS
BORDEAUX	: 28 Octobre - 1 ^{er} Novembre • 57 ^e EXPOSITION NATIONALE 17, rue du Temple — 33000 BORDEAUX
ROUBAIX	: 29 Octobre - 1 ^{er} Novembre • 50 ^e EXPOSITION INTERNATIONALE M. QUINT — 74, rue Albert Thomas — 59100 ROUBAIX
LIMOGES	: 5 - 6 Novembre • EXPOSITION NATIONALE Championnat de France du Carneau M. TIXIER — 4, allée du Maréchal Fayolle — 87100 LIMOGES
HAUTMONT	: 9 - 13 Novembre • EXPOSITION NATIONALE M. CARNIÈRE — 110, rue de l'Abattoir — 59330 HAUTMONT
JUAN-LES-PINS	: 23 - 27 Novembre • EXPOSITION INTERNATIONALE DE COLOMBICULTURE M. G. BIANCHIMANI — Vieux Chemin de Vallauris — 06160 JUAN-LES-PINS

EXPOSITIONS A L'ÉTRANGER

UTRECHT : 6 - 9 Octobre 1977

FRANCFORT : 2 - 4 Décembre 1977 — 59^e National Allemand

DORTMUND : 7 - 8 Janvier 1978 — Européenne du Modène

LA HAYE : 13 - 15 Janvier 1978

WELS (Autriche) : 14 - 15 Janvier 1978 — Exposition Européenne





Hall d'exposition du Pigeon-Club du Bas-Rhin
à Illkirch-Graffenstaden



Vue de l'intérieur du hall du Pigeon-Club du Bas-Rhin

PREMIÈRE NATIONALE DU PIGEON DE LA S.N.C.

Un désir devient réalité

La Société Nationale de Colombiculture a décidé d'organiser les 4 et 5 Février 1978 sa "Première Nationale de Pigeons".

L'organisation matérielle de cette manifestation a été confiée au "Pigeon-Club" du Bas-Rhin qui possède un magnifique hall d'exposition de 1.200 m² sis à Illkirch-Graffenstaden dans un faubourg sud de Strasbourg à 10 km facilement accessible par l'autoroute direction Colmar.

Bien sûr, pour certains c'est à l'autre bout de l'hexagone, mais à l'avenir ce sera également à l'autre bout pour les éleveurs de l'Est.

Une chose est certaine, vous serez chaleureusement reçu par un club de plus de 250 membres, qui a été capable de construire son propre hall d'exposition et depuis plus de dix ans organise une exposition du club avec plus de 2.000 pigeons, avec la plus grande variété de pigeons de fantaisie, un club dynamique et vivant, avec une équipe de dirigeants compétents.

Pour toutes ces raisons et bien d'autres, la S.N.C. a confié cette "Grande Première" au Pigeon-Club du Bas-Rhin.

Celui-ci fera tout son possible pour un accueil des plus agréables.

Sur place vous pourrez déguster des spécialités alsaciennes préparées par les épouses des membres.

Pour vos réservations éventuelles des chambres d'hôtel, veuillez écrire le plus tôt possible à M. Becker Jean-Philippe, 11, rue Traversière, 67400 Illkirch-Graffenstaden. Dans la mesure du possible le club essaiera de vous loger au faubourg même non loin de l'exposition.

Le règlement d'exposition et les feuilles d'engagement vous seront transmis avec le prochain bulletin de la S.N.C. avec tous les renseignements relatifs à cette manifestation.

Soyez nombreux à ce premier rendez-vous

G. TANCHOU

CHAMPIONNAT DE FRANCE DU CARNEAU

Le Carneau-Club Français organise son Championnat annuel à Limoges les 5 et 6 Novembre. Au cours de cette manifestation qui accueillera, nous l'espérons,

plusieurs centaines de Carneaux, comme chaque année, une quinzaine de coupes seront remises aux lauréats par le C.C.F.

COUPE DE FRANCE ET CHAMPIONNAT DES AMIS DU MONDAIN

La Coupe de France du Mondain aura lieu du 24 au 27 Novembre 1977 à Valence d'Agen (82). Cette compétition aura lieu sur 4 sujets bagués 1977 avec addition de points dans chaque coloris ; lors de cette exposition sera décerné pour la première fois le "Challenge Delandre" qui sera attribué à l'éleveur

ayant fourni la meilleure présentation de Mondain. Dans cette même ville, le Samedi 26 Novembre, aura lieu la journée européenne du Mondain avec des éleveurs de Belgique, d'Allemagne, de Suisse et d'Italie.



C'EST UN LABORATOIRE _____ _____ UNIQUEMENT COLOMBOPHILE

LE SEUL QUI METTE A VOTRE DISPOSITION :

- Le fruit de **30 ANS D'EXPÉRIENCE PRATIQUE** dans l'élevage du pigeon,
- Ses vétérinaires et techniciens pour tous **DIAGNOSTICS GRATUITS** et **CONSEILS D'ÉLEVAGE**
- Sa gamme de **PRODUITS ET MÉDICAMENTS** spécialement étudiés pour les **PIGEONS**, et pour les **PIGEONS** seulement.

Laboratoire **ORNIS**, Dr J.-P. STOSSKOPF, Vétérinaire Spécialiste
60510 BRESLES (Oise) - Tél. 480.90.12

LA RÉUSSITE DANS L'ÉLEVAGE : SANTÉ D'ABORD

Dans l'eau de boisson :

Trichorex : Antitrichomonas, Muguet, Abcès, Diarrhée verte.

Coccidex : Anticoccidien, Diarrhée de 10 jours, Amaigrissement, Diarrhée.

Aquaverm : Vermifuge.

pour le bec :

Pijosan : Dragées polyvalentes pour jeunes au nid et adultes.
Toutes indispositions.

Néo-Vermex : Comprimés vermifuges surpuissants.

CE SONT DES PRODUITS ORNIS



Demandez notre catalogue et notre tableau de maladies gratuits.

Notre « Petit Guide d'Élevage »

contre envoi d'une enveloppe timbrée.