STANDARD OFFICIEL

DE LA

TOURTERELLE RIEUSE

Société Nationale de Colombiculture

© Société Nationale de Colombiculture

Editions SNC
ISBN 978-2-9511908-4-9

Imprimé en France 2021

Reproduction, même partielle, et traduction interdites,
sauf accord préalable de la SNC

PREFACE

Les tourterelles forment-elles un monde à part ? Oui et non…
Non, car elles ont désormais pleinement intégré la colombiculture, et même, plus généralement, l'aviculture. Depuis l'accès généralisé à Internet, c'est toute une tradition d'élevage de cette espèce qu'il nous est progressivement donné de partager, pour notre plus grand plaisir et le meilleur bénéfice de notre passion, qui gagne ainsi en diversité.
Non encore, car, du point de vue morphologique, le lien de parenté avec l'espèce pigeons est plus qu'évident et l'association des deux espèces au sein d'un même corps technique s'est très vite imposée.
Non enfin, car les approches de l'élevage, du processus de sélection ne sont pas sensiblement différentes, pas plus que la pertinence d'une méthode de jugement dite "à l'appréciation". Davantage qu'une addition mathématique de critères, il s'agit d'apprécier le pour et le contre d'un aspect général, d'une présentation, et par là même de valoriser et d'encourager l'élevage au lieu de le sanctionner.

Mais, oui, les tourterelles ont aussi leur identité propre. Bien qu'elles aient été accueillies et intégrées dans le giron des pigeons, il s'agit bel et bien d'une espèce différente. Avec ses règles propres dans le comportement, le caractère, l'élevage, la reproduction, la génétique, le jugement en exposition. Le vocabulaire lui-même est spécifique à l'espèce, les mots employés pour la décrire diffèrent, autant que les dénominations des variétés d'où une délicieuse poésie fruitée n'est pas absente.

Depuis quelques années le développement de l'élevage de la tourterelle est fulgurant, de nombreux éleveurs se passionnent pour elle, il est courant d'en voir plusieurs dizaines en exposition, plusieurs centaines au championnat. Les variétés se sont multipliées en France, ont été répertoriées et sont répertoriées dans ce standard.
Autant de raisons pour lesquelles le deuxième standard**,** publié en 2008 pour la première fois indépendamment de celui des pigeons**,** était devenu obsolète. Un nouveau document de travail s'imposait donc, permettant à chacun : club, éleveurs et juges de disposer de textes officiels communs et fiables. Pour le club, un nouvel outil pour la promotion de l'espèce, pour les éleveurs une référence dans leur travail de sélection et pour les juges colombicoles, un support objectif, un guide précieux dans le travail d'orientation qui leur est demandé.

La formule choisie, sous forme de classeur, facilite l'adaptation aux évolutions à venir. Mais pour la première fois, un standard est disponible gratuitement sur Internet avec sa propre page sur les sites internet du Club Français de la Tourterelle Rieuse et de la Société Nationale de Colombiculture.

La SNC, grâce au travail effectué par la Commission nationale des standards pigeons en liaison avec le Club Français de la Tourterelle Rieuse, est heureuse de mettre le nouveau standard des tourterelles à la disposition de tous. Puisse-t-il concourir au développement harmonieux de cette espèce et lui permettre de séduire de nouveaux éleveurs, en France et par-delà les frontières.

La Commission des Standards

La Commission des Standards remercie :

- tous ses membres et collaborateurs qui ont participé à l'élaboration de ce recueil.
- le Club Français de la Tourterelle Rieuse.
- Jean-Louis FRINDEL qui a réalisé le dessin "standard" et apporté des raisonnements pragmatiques dans la révision des fiches standards.
- Anthime LEROY qui a rédigé la préface de cet ouvrage.
- Cynthia ANANIA, vétérinaire, qui a apporté toutes les explications génétiques aux variétés répertoriées.
- Vincent CHERADAME et Alain DEBORD qui ont œuvré sans compter, par leur investissement personnel, leurs idées, leurs photos, et leurs compétences techniques indispensables pour donner à cet ouvrage toute sa dimension et sa cohérence.


Philippe HUDRY
Président de la Commission des Standards

SOMMAIRE

- **Standard général de la tourterelle rieuse**
- **Les tourterelles blanches**
- **Les tourterelles aux yeux pointillés**
- **Les tourterelles colorées**
- **Les tourterelles colorées lilas**
- **Les tourterelles gris perlé**
- **Les tourterelles blanc perlé**
- **Les tourterelles blanc perlé à dessus blanc**
- **Les tourterelles à cou coloré**
- **Les tourterelles à tête colorée**
- **Les tourterelles grison**
- **Les tourterelles panachées**
- **Les tourterelles panachées à épaulettes**
- **Les tourterelles tachetées**
- **Les tourterelles soyeuses**
- **Les tourterelles avec attributs de structure**

Chaque variété fait l'objet d'une fiche descriptive précise, dans laquelle sont définies les différentes tonalités de couleur de chaque partie de l'anatomie de la tourterelle rieuse.
Les différences paraissent parfois minimes d'une variété à l'autre mais chacune correspond à une codification génétique bien distincte.
15 groupes permettent de classer les variétés par famille. C'est dans cet ordre et avec ces appellations que les tourterelles doivent être présentées et classées dans le catalogue des expositions.
Les tableaux récapitulatifs des caractéristiques de couleur à la fin des fiches de groupes complexes sont très synthétiques dans l'expression des termes employés et ne peuvent, en aucun cas, se substituer aux descriptions que nous avons voulues aussi rigoureuses que possible à l'intérieur des fiches.

LA TOURTERELLE RIEUSE



Origine

La Tourterelle rieuse dans nos expositions (Streptopelia Roseogrisea risoria) est la forme domestique avec des mutations de couleurs de la Tourterelle rose et grise d'Afrique (Streptopelia Roseogrisea). Un certain nombre de mutations sont le fruit de croisements avec les espèces voisines : la Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) et la Tourterelle des bois européenne (Streptopelia turtur), en particulier. L'introduction de ces apports extérieurs ne doit pas avoir pour effet de modifier la morphologie, la taille, le comportement ou le chant de la Tourterelle rieuse.

Aspect général

Forme svelte. Longueur de 25 à 27 cm de la pointe du bec à l'extrémité de la queue pour une masse d'environ 170 g. Le corps est bien proportionné, de forme allongée, avec la partie la plus large à l'avant des ailes qui s'effile avec élégance jusqu'à la queue, sans partie saillante. Au sol avec un comportement calme, le port est voisin de 45°. Il n'y a pas de dimorphisme sexuel.

Caractères anatomiques

Tête moyenne, de forme plutôt allongée. Vue de profil, la courbe du front est régulière et s'élève graduellement. La courbure est moins accusée sur le dessus et reprend une forme plus arrondie à l'arrière. De face, le front est pincé. La tête peut être ornée d'une huppe, d'une coquille, d'une crinière, d'une huppe associée à une crinière, d'une coquille associée à une crinière, d'une visière ou toupet.

Œil l'œil le plus répandu est l'œil rouge orangé avec une couleur de l'iris plus ou moins soutenue, allant d'orangé vif à rouge rubis. Il existe l'œil gris pointillé orangé à rouge et l'œil noir propre aux tourterelles panachées**.** Il est pratiquement situé au centre de la tête.

Paupière elle est formée d'un cercle fin et régulier très discret et se confond avec la couleur du plumage.

Bec plutôt long, environ 1,5 cm. Il est droit avec la mandibule supérieure recourbée à l'extrémité. Sa couleur varie du blanc rosé très clair au noir suivant les variétés.

Bande de nuque ce terme désigne le demi-collier caractéristique à l'arrière du cou. Sa largeur n'a pas d'importance mais elle doit être régulière. Elle est présente dans toutes les variétés. Dans certaines variétés blanches et panachées, elle n'est visible que par une structure différente de la plume. Chez les unicolores, les unicolores lilas et la plupart des cendrées, panachées ou tachetées, elle est pure et régulière. Cependant chez certaines panachées ou tachetées, la couleur du manteau associe 2 couleurs de base en plus du blanc et génère le panachage de la bande de nuque. Dans ce dernier cas, il ne s'agit pas d'un défaut.

Cou de longueur moyenne. L'attache à la tête est en harmonie avec le reste du corps. La gorge est bien arrondie.

Poitrine elle est bien arrondie. La courbure de la poitrine et la ligne ventrale sont régulières.

Dos incliné vers l'arrière, il assure à la tourterelle un port à 45° lorsqu'elle est posée au sol. La ligne du dos est régulière et inclinée de la base du cou à l'extrémité de la queue.

Ailes elles sont plaquées au corps et donnent une allure à la fois svelte et compacte. Les rémiges reposent sur la queue, à environ 5 à 6 cm de l'extrémité, sans se croiser. Le bouclier est large à l'avant et étroit à l'arrière. Les rémiges sont plutôt larges et leur extrémité est arrondie. Chez la soyeuse, les rémiges sont portées relevées.

Queue elle se compose de 12 rectrices d'environ 12 cm. Au repos, elle est portée serrée et sa largeur n'excède pas 3 cm. Chez la soyeuse, elle est en éventail. Dans de nombreuses variétés, les rectrices externes présentent une couleur différente des rectrices centrales qui sont généralement de la couleur du manteau.

Pattes elles sont lisses et de longueur moyenne. Leur couleur varie du rose au violet en fonction de la variété.

Ongles leur couleur n'a pas d'importance. Ils doivent être propres et ne pas excéder 3 mm.

Plumage il y a deux catégories : à plumage lisse et serré et à plumage soyeux. Le plumage doit être en excellent état, la mue bien achevée. Dans la catégorie soyeuse, il est flou et confère au sujet l'impression d'un volume supérieur. La soyeuse (sujet hétérozygote pour le gène Silky = soyeux) possède une structure du plumage particulière à l'aspect "ébouriffé", doux au toucher, d'où son nom.

Variétés

Les variétés sont classées en 15 groupes. La Tourterelle rieuse classique comme la soyeuse sont présentées dans les groupes et variétés suivants. L'appartenance à la catégorie soyeuse précède la dénomination de la couleur, exemple : soyeuse blanc neige, soyeuse sauvage, soyeuse panachée blanc fauve… Chaque variété peut être porteuse d'un attribut (huppe, coquille, visière). La tourterelle est alors dite huppée, à coquille ou à visière. Le terme de l'attribut précède la variété : exemple huppée blanche.

Les variétés sont classées en 15 groupes :

- Les tourterelles blanches
- Les tourterelles aux yeux pointillés
- Les tourterelles colorées
- Les tourterelles colorées lilas
- Les tourterelles gris perlé
- Les tourterelles blanc perlé
- Les tourterelles blanc perlé à dessus blanc
- Les tourterelles à cou coloré
- Les tourterelles à tête colorée
- Les tourterelles grison
- Les tourterelles panachées
- Les tourterelles panachées à épaulettes
- Les tourterelles tachetées
- Les tourterelles soyeuses
- Les tourterelles avec attributs de structure

Seules les variétés répertoriées dans la liste ci-dessous sont admises en exposition et peuvent être jugées.

Groupe 1
Les tourterelles blanches : 4 variétés

- blanche à œil noir
- blanche
- blanc neige
- blanc crème

Groupe 2
Les tourterelles aux yeux pointillés : 12 variétés

- ivoire
- ivoire dilué
- crème
- crème clair
- abricot
- abricot clair
- abricot cendré
- champagne
- blond givré
- fauve givré
- argenté givré
- platine

Groupe 3
Les tourterelles colorées : 16 variétés

- rosée
- rosé clair
- blonde
- blond poudré
- fauve
- fauve poudré
- grise
- gris poudré
- lavande
- lavande dilué
- orange
- orange clair
- pêche
- pêche poudré
- pêche clair
- pêche dilué

Groupe 4
Les tourterelles colorées lilas : 6 variétés

- sauvage
- clémentine
- clémentine poudré
- clémentine dilué
- mandarine
- mandarine clair

Groupe 5
Les tourterelles gris perlé : 4 variétés

- gris perlé abricot
- gris perlé pêche
- gris perlé orange
- gris perlé mandarine

Groupe 6
Les tourterelles blanc perlé : 5 variétés

- blanc perlé abricot
- blanc perlé pêche
- blanc perlé rosée
- blanc perlé orange
- blanc perlé mandarine

Groupe 7
Les tourterelles blanc perlé à dessus blanc : 5 variétés

- blanc perlé abricot à dessus blanc
- blanc perlé pêche à dessus blanc
- blanc perlé rosée à dessus blanc
- blanc perlé orange à dessus blanc
- blanc perlé mandarine à dessus blanc

Groupe 8
Les tourterelles à cou coloré : 5 variétés

- cou coloré abricot délavé
- cou coloré pêche délavé
- cou coloré rosé délavé
- cou coloré orange délavé
- cou coloré mandarine délavé

Groupe 9
Les tourterelles à tête colorée : 3 variétés

- tête colorée prune
- tête colorée grise
- tête colorée orange

Groupe 10
Les tourterelles grison : liste des couleurs permettant une expression suffisante du gène grison
abricot, abricot clair, abricot cendré, blond givré, fauve givré, blonde, fauve, orange, orange clair, pêche, pêche clair, gris, gris poudré, sauvage, clémentine, mandarine, mandarine clair, blanc perlé abricot, blanc perlé pêche, blanc perlé orange, blanc perlé mandarine, blanc perlé abricot à dessus blanc, blanc perlé pêche à dessus blanc, blanc perlé orange à dessus blanc et blanc perlé mandarine à dessus blanc.

Groupe 11

Les tourterelles panachées bicolores et tricolores : liste des combinaisons

blanc sauvage, blanc fauve, blanc blond, blanc gris, blanc orange, blanc crème, blanc rosé, blanc abricot, blanc champagne, blanc pêche, blanc clémentine, blanc sauvage fauve, blanc fauve orange, blanc blond orange, blanc gris sauvage, blanc gris fauve, blanc pêche fauve…

Groupe 12

Les tourterelles panachées à épaulettes bicolores et tricolores : liste des combinaisons

blanc sauvage, blanc fauve, blanc blond, blanc gris, blanc orange, blanc crème, blanc rosé, blanc abricot, blanc champagne, blanc pêche, blanc clémentine, blanc sauvage fauve, blanc fauve orange, blanc blond orange, blanc gris sauvage, blanc gris fauve, blanc pêche fauve…

Groupe 13

Les tourterelles tachetées bicolores et tricolores : liste des combinaisons

blanc sauvage, blanc fauve, blanc blond, blanc gris, blanc orange, blanc crème, blanc rosé, blanc abricot, blanc champagne, blanc pêche, blanc sauvage fauve, blanc fauve orange, blanc blond orange, blanc gris sauvage, blanc gris fauve, blanc pêche fauve…

Groupe 14

Les tourterelles soyeuses : toutes les variétés et toutes les combinaisons ci-dessus sont admises.

Groupe 15

Les tourterelles avec attributs de structure : (huppe, coquille, visière ou toupet) : toutes les variétés et toutes les combinaisons ci-dessus sont admises.

Défauts graves
Sujet trop volumineux ou étriqué, en dehors du format de l'espèce. Tenue déséquilibrée vers l'avant. Plumage non terminé, sujet en mue ou présenté trop jeune. Ailes portées au-dessous de la queue. Dos découvert (sauf chez la soyeuse). Manque de préparation : plumage sale, bec crochu, pattes et bagues non nettoyées, ongles sales et/ou trop longs, deux ongles absents. Couleurs et marques non conformes à la description de la variété. Tête trop ronde ou trop plate. Comportement agité en cage. Hampes des plumes dénudées chez la soyeuse.

Jugement
Aspect général, proportions et élégance, plumage, couleur, tête et yeux, comportement.

Remarques importantes
- Une attention particulière doit être accordée à la présentation générale et à l'attitude du sujet. Seuls les sujets ayant atteint leur plein développement, calmes, dont la mue est terminée, dont le plumage est en parfait état et qui ont fait l'objet d'une préparation attentive peuvent prétendre aux notes maximales.
- Une relative indulgence doit être accordée à l'appréciation de la qualité du plumage de la soyeuse.
- La couleur des yeux est également déterminante et constitue le seul critère de différenciation entre certaines variétés. Compte tenu de la taille modeste de l'œil de la tourterelle, l'usage d'une loupe peut s'avérer utile pour éviter toute confusion.
- Une vérification minutieuse de chaque critère de la variété considérée doit être opérée. A partir de 3 critères permettant de douter de la pureté de la variété, le sujet est pénalisé.
- La tourterelle doit être manipulée avec soin pour éviter l'arrachage ou l'endommagement des plumes. La prise en main doit se faire par l'immobilisation du corps et des deux ailes en saisissant l'oiseau par le dessus. Toutefois il est conseillé de ne pas manipuler les tourterelles plus qu'il n'est nécessaire.
- La tourterelle doit être présentée dans des cages adaptées de 40 x 40 cm au maximum afin de pouvoir apprécier convenablement les proportions et la tenue.

Bague 6 mm

BLANCHE A ŒIL NOIR



Apparence d'ensemble
Tourterelle entièrement blanche à œil noir.

Description de la coloration

Tête	blanche.
Bande de nuque	blanche, sa présence n'est visible que par la structure différente des plumes à cet endroit.
Bec	blanc rosé clair.
Œil	brun foncé.
Poitrine	blanche.
Ailes	bouclier blanc, rémiges blanches.
Queue	intégralement blanche.

Défauts
Présence d'un voile coloré, plumes autres que blanches, bec impur, œil autre que brun foncé.

BLANCHE



Apparence d'ensemble
Tourterelle blanche à bande de nuque beige clair.

Description de la coloration

Tête	blanche.
Bande de nuque	beige clair, régulière et bien marquée.
Bec	blanc rosé.
Œil	orangé à rouge.
Poitrine	blanche.
Ailes	bouclier blanc, rémiges blanches.
Queue	blanche avec la base des rectrices beige clair.

Défauts
Présence d'un voile coloré sur le manteau. Couleur de la bande de nuque différente, œil trop clair ou terne, couleur de la base des rectrices non conforme. Bec impur.

BLANC NEIGE



Apparence d'ensemble
Tourterelle blanc immaculé.

Description de la coloration

Tête	blanche.
Bande de nuque	blanche, sa présence n'est visible que par la structure différente des plumes à cet endroit.
Bec	blanc rosé.
Œil	orangé à rouge vif.
Poitrine	blanche.
Ailes	bouclier blanc pur, rémiges blanches.
Queue	intégralement blanche.

Défauts
Présence d'un voile coloré, plumes autres que blanches, bec impur, œil trop clair ou terne, base des rectrices ou bande de nuque colorées.

BLANC CREME



Apparence d'ensemble
Tourterelle blanche avec un voile de couleur crème clair et une bande de nuque beige soutenu.

Description de la coloration

Tête	blanc à voile crème clair.
Bande de nuque	beige soutenu.
Bec	blanc rosé.
Œil	orangé à rouge.
Poitrine	blanche.
Ailes	boucliers et rémiges à voile crème clair.
Queue	blanche avec la base des rectrices beige, rectrices centrales à voile blanc crème.

Défauts
Absence de voile crème clair, couleur de la bande de nuque trop claire, œil trop clair ou terne, base des rectrices blanche.

IVOIRE



Apparence d'ensemble
Tourterelle à manteau ivoire : beige gris très clair, à bande de nuque brun foncé.

Description de la coloration

Tête	ivoire clair presque blanc.
Bande de nuque	brun foncé.
Bec	corne clair.
Œil	gris pointillé orangé à rouge.
Poitrine	ivoire clair presque blanc.
Ailes	bouclier ivoire, rémiges primaires ivoire, rémiges secondaires ivoire.
Queue	rectrices extérieures beiges avec l'extrémité blanche, rectrices centrales ivoire, base des rectrices gris-brun.

Défauts
Couleur du manteau hétérogène ou trop foncée, couleur de la bande de nuque trop claire, tête et poitrine trop colorées.

IVOIRE DILUE



Apparence d'ensemble
Tourterelle à manteau ivoire dilué : gris-beige très clair, à bande de nuque brune.

Description de la coloration

Tête	ivoire dilué presque blanc.
Bande de nuque	brune.
Bec	corne clair.
Oeil	gris pointillé orangé à rouge.
Poitrine	ivoire dilué clair presque blanc.
Ailes	bouclier de couleur ivoire dilué, rémiges ivoire dilué.
Queue	rectrices extérieures gris très clair avec l'extrémité blanche, rectrices centrales ivoire dilué, presque blanc, base des rectrices gris-brun.

Défauts
Couleur du manteau hétérogène ou trop foncée, couleur de la bande de nuque trop claire, tête et poitrine trop colorées.

CREME



Apparence d'ensemble
Tourterelle crème : beige-gris soutenu, à bande de nuque brun foncé.

Description de la coloration

Tête	crème très clair presque blanche.
Bande de nuque	brun foncé.
Bec	corne clair.
Œil	gris pointillé orangé à rouge.
Poitrine	crème très clair presque blanche.
Ailes	bouclier crème, rémiges primaires crème bordées crème très clair, rémiges secondaires crème.
Queue	rectrices extérieures gris-brun avec l'extrémité blanche, rectrices centrales crème, base des rectrices brun foncé.

Défauts
Couleur du manteau hétérogène, couleur de la bande de nuque trop claire, tête et poitrine trop colorées.

CREME CLAIR



Apparence d'ensemble
Tourterelle crème très clair, à bande de nuque beige.

Description de la coloration

Tête	blanche.
Bande de nuque	beige.
Bec	blanc rosé.
Œil	gris pointillé orangé à rouge.
Poitrine	blanche.
Ailes	bouclier et rémiges à voile crème clair.
Queue	blanche avec la base des rectrices beige, rectrices centrales blanches à voile crème clair.

Défauts
Absence de voile crème clair, couleur de la bande de nuque trop claire, base des rectrices blanche, bec impur.

ABRICOT



Apparence d'ensemble
Tourterelle à manteau abricot : beige orangé clair.

Description de la coloration

Tête	crème clair.
Bande de nuque	brun foncé.
Bec	corne clair.
Œil	gris pointillé orangé à rouge.
Poitrine	crème clair.
Ailes	bouclier abricot, rémiges primaires gris-beige bordées beige, rémiges secondaires abricot.
Queue	rectrices extérieures grises avec l'extrémité blanche, rectrices centrales abricot, base des rectrices brune.

Défauts
Couleur du manteau hétérogène, couleur de la bande de nuque ou de la base des rectrices trop claire.

ABRICOT CLAIR



Apparence d'ensemble
Tourterelle à manteau abricot soutenu : beige orangé soutenu.

Description de la coloration

Tête	crème clair, presque blanc.
Bande de nuque	blanche, sa présence n'est visible que par la structure différente des plumes à cet endroit.
Bec	corne clair.
Œil	gris pointillé orangé à rouge.
Poitrine	crème clair, presque blanc.
Ailes	bouclier abricot clair, rémiges primaires blanches, rémiges secondaires blanches à abricot.
Queue	rectrices extérieures blanches, rectrices centrales abricot, base des rectrices blanche**.**

Défauts
Couleur du manteau trop claire, traces de perlage, bande de nuque autre que blanche, bec trop foncé, base des rectrices colorée.

ABRICOT CENDRE



Apparence d'ensemble
Tourterelle abricot : beige orangé.

Description de la coloration

Tête	crème clair, plus colorée chez la femelle.
Bande de nuque	gris clair.
Bec	corne à l'extrémité plus foncée.
Œil	gris pointillé orangé à rouge.
Poitrine	crème clair.
Ailes	bouclier abricot, rémiges primaires gris-beige clair, rémiges secondaires abricot.
Queue	rectrices extérieures gris-beige avec l'extrémité blanche, rectrices centrales abricot cendré, base des rectrices gris très clair.

Défauts
Couleur du manteau trop claire, traces de perlage, bande de nuque autre que gris clair, base des rectrices blanche.

CHAMPAGNE



Apparence d'ensemble
Tourterelle champagne : rose orangé très clair.

Description de la coloration

Tête	blanche.
Bande de nuque	blanche, sa présence n'est visible que par la structure différente des plumes à cet endroit.
Bec	corne très clair.
Œil	gris pointillé orangé à rouge
Poitrine	blanche.
Ailes	bouclier champagne, rémiges primaires et secondaires blanches.
Queue	rectrices extérieures blanches, rectrices centrales champagne, base des rectrices blanche.

Défauts
Couleur du manteau trop claire ou trop foncée, trace de perlage, base des rectrices colorée.

BLOND GIVRE



Apparence d'ensemble
Tourterelle de couleur blond givré : fond ocre clair.

Description de la coloration

Tête	crème clair presque blanc, plus colorée chez la femelle.
Bande de nuque	gris-brun givré.
Bec	corne.
Œil	gris pointillé orangé à rouge.
Poitrine	crème clair presque blanche.
Ailes	bouclier blond givré, rémiges primaires gris-beige givré bordées crème, rémiges secondaires gris-beige à blond.
Queue	rectrices extérieures gris-brun givré avec l'extrémité blanche, rectrices centrales blond givré, base des rectrices brun givré.

Défauts
Couleur du manteau trop claire ou trop foncée, liseré absent ou trop envahissant, bande de nuque trop claire ou ne présentant pas de liseré, absence de givre sur les rémiges primaires et sur les rectrices.

FAUVE GIVRE



Apparence d'ensemble
Tourterelle de couleur fauve givré : fond ocre gris.

Description de la coloration

Tête	gris-crème clair, plus colorée chez la femelle.
Bande de nuque	brun foncé givré.
Bec	corne à corne foncé.
Œil	gris pointillé orangé à rouge.
Poitrine	crème clair.
Ailes	bouclier fauve givré, rémiges primaires gris-brun givré bordées crème, rémiges secondaires gris-brun à fauve.
Queue :	rectrices extérieures gris-brun givré avec l'extrémité blanche, rectrices centrales fauve givré, base des rectrices brun givré.

Défauts
Couleur du manteau trop claire ou trop foncée, liseré absent ou trop envahissant, bande de nuque trop claire ou ne présentant pas de liseré, absence de givre sur les rémiges primaires et sur les rectrices.

ARGENTE GIVRE



Apparence d'ensemble
Tourterelle de couleur argentée : gris bleuté clair.

Description de la coloration

Tête	gris très clair, plus colorée chez la femelle.
Bande de nuque	gris foncé.
Bec	corne.
Œil	gris pointillé orangé à rouge.
Poitrine	gris très clair.
Ailes	bouclier de couleur argenté givré, rémiges gris givré bordées gris clair, rémiges secondaires gris clair à argenté.
Queue	rectrices extérieures gris clair givré avec l'extrémité blanche, rectrices centrales argenté, base des rectrices gris clair givré.

Défauts
Couleur du manteau trop claire ou trop foncée, liseré absent ou trop envahissant, bande de nuque trop claire ou ne présentant pas de liseré, absence de givre sur les rémiges primaires et sur les rectrices.

PLATINE



Apparence d'ensemble
Tourterelle de couleur platine : fond clair à très léger voile gris-bleu, givré.

Description de la coloration

Tête	gris-bleu très clair, presque blanche.
Bande de nuque	gris-bleu très clair, sa présence n'est visible que par la structure différente des plumes à cet endroit.
Bec	blanc rosé.
Œil	gris pointillé orangé à rouge.
Poitrine	gris-bleu très clair, presque blanche.
Ailes	bouclier de couleur platine, rémiges très légèrement gris bleuté presque blanc.
Queue	rectrices extérieures gris-bleu très clair avec l'extrémité blanche, rectrices centrales platine, base des rectrices gris très clair.

Défauts
Couleur du manteau trop soutenue, bande de nuque trop colorée.

ROSEE




Apparence d'ensemble
Tourterelle de couleur rosée : rose pâle.

Description de la coloration

Tête	rosée, légèrement plus clair que le manteau.
Bande de nuque	beige.
Bec	blanc rosé bien pigmenté.
Œil	orangé à rouge.
Poitrine	rosée, légèrement plus clair que le manteau.
Ailes	bouclier rosé, rémiges primaires et secondaires rosées.
Queue	rectrices extérieures blanches à base beige clair, rectrices centrales rosées.

Défauts
Couleur rosée du manteau insuffisante**,** traces de perlage, œil trop clair, bec dépigmenté, bande de nuque trop claire.

ROSÉ CLAIR



Apparence d'ensemble
Tourterelle de couleur rosée : rose pâle, à bande de nuque et vols blancs.

Description de la coloration

Tête	rosée, légèrement plus claire que le manteau.
Bande de nuque	blanche.
Bec	blanc rosé bien pigmenté.
Œil	orangé à rouge.
Poitrine	rosée, légèrement plus claire que le manteau.
Ailes	bouclier rosé, rémiges primaires blanches et rémiges secondaires blanches à rosées.
Queue	rectrices extérieures blanches, rectrices centrales rosées, base des rectrices blanche**.**

Défauts
Couleur rosée du manteau insuffisante**,** traces de perlage, œil trop clair, bec dépigmenté.

BLONDE



Apparence d'ensemble
Tourterelle de couleur blonde : ocre jaune.

Description de la coloration

Tête	beige.
Bande de nuque	noire avec liseré blanc présent sur la partie supérieure. Le liseré est souhaitable sur la partie inférieure mais n'est pas exigé.
Bec	corne foncé, base plus claire.
Oeil	orangé à rouge.
Poitrine	beige.
Ailes	bouclier blond, rémiges primaires brun-gris bordées de beige, rémiges secondaires brun-gris clair à blond.
Queue	rectrices extérieures brun-gris avec l'extrémité blanche, rectrices centrales blondes, base des rectrices brun foncé.

Défauts
Manque d'homogénéité ou de pureté du manteau, absence de liseré supérieur sur la bande nuque, œil trop clair ou terne, base des rectrices trop claire.

BLOND POUDRE



Apparence d'ensemble
Tourterelle de couleur blond poudré : ocre jaune poudré du manteau à la queue.

Description de la coloration

Tête	beige.
Bande de nuque	noire avec liseré blanc présent sur la partie supérieure. Le liseré est souhaitable sur la partie inférieure mais n'est pas exigé.
Bec	corne foncé.
Œil	orangé à rouge.
Poitrine	beige.
Ailes	bouclier blond poudré, rémiges primaires brun-gris bordées de beige, rémiges secondaires brun-gris clair à blond.
Queue	rectrices extérieures brun-gris avec l'extrémité blanche, rectrices centrales blond poudré, base des rectrices brun foncé.

Défauts
Dessin poudré insuffisamment exprimé sur le manteau, absence de liseré supérieur sur la bande nuque, œil trop clair ou terne, base des rectrices trop claire.

FAUVE



Apparence d'ensemble
Tourterelle de couleur fauve : ocre brun.

Description de la coloration

Tête	beige-gris, plus foncée chez la femelle.
Bande de nuque	noire avec liseré blanc présent sur la partie supérieure. Le liseré est souhaitable sur la partie inférieure mais n'est pas exigé.
Bec	corne foncé.
Œil	orangé à rouge.
Poitrine	beige-gris.
Ailes	bouclier fauve, rémiges primaires brun foncé bordées de gris-beige, rémiges secondaires brun foncé à fauve.
Queue	rectrices extérieures gris-brun avec l'extrémité blanche, rectrices centrales fauve, base des rectrices brun intense.

Défauts
Manque d'homogénéité ou de pureté du manteau, absence de liseré supérieur sur la bande nuque, œil trop clair ou terne, base des rectrices trop claire.

FAUVE POUDRE



Apparence d'ensemble
Tourterelle de couleur fauve poudré : ocre brun poudré du manteau à la queue.

Description de la coloration

Tête	beige-gris, plus foncée chez la femelle.
Bande de nuque	noire avec liseré blanc présent sur la partie supérieure. Le liseré est souhaitable sur la partie inférieure mais n'est pas exigé.
Bec	corne foncé.
Œil	orangé à rouge.
Poitrine	beige-gris.
Ailes	bouclier fauve poudré, rémiges primaires brun foncé bordées de gris-beige, rémiges secondaires brun foncé à fauve.
Queue	rectrices extérieures gris-brun avec l'extrémité blanche, rectrices centrales fauve, base des rectrices brun intense.

Défauts
Dessin poudré insuffisamment exprimé sur le manteau, absence de liseré supérieur sur la bande nuque, œil trop clair ou terne, base des rectrices trop claire.

GRISE



Apparence d'ensemble
Tourterelle de couleur gris bleuté.

Description de la coloration

Tête	gris clair, plus foncée chez la femelle.
Bande de nuque	noire.
Bec	corne foncé, presque noir.
Œil	orangé à rouge.
Poitrine	gris clair.
Ailes	bouclier gris bleuté, plus foncé chez la femelle, rémiges primaires gris foncé bordées gris clair, rémiges secondaires grises bordées gris clair à gris bleuté.
Queue	rectrices extérieures grises avec l'extrémité blanche, rectrices centrales grises, base des rectrices noire.

Défauts
Manteau non homogène chez les mâles, œil trop clair ou terne, base des rectrices trop claire.

GRIS POUDRE



Apparence d'ensemble
Tourterelle de couleur gris poudré : gris bleuté poudré du manteau à la queue.

Description de la coloration

Tête	gris clair, plus foncée chez la femelle.
Bande de nuque	noire.
Bec	corne foncé, presque noir.
Œil	orangé à rouge.
Poitrine	gris clair.
Ailes	manteau gris poudré, rémiges primaires grises bordées gris clair, rémiges secondaires grises bordées de gris clair à gris bleuté.
Queue	rectrices extérieures grises avec l'extrémité blanche, rectrices centrales gris poudré, base des rectrices gris foncé.

Défauts
Dessin poudré insuffisamment exprimé sur le manteau, œil trop clair ou terne, base des rectrices trop claire.

LAVANDE



Apparence d'ensemble
Tourterelle de couleur lavande : gris bleuté tendre autant que possible uniforme.

Description de la coloration

Tête	lavande.
Bande de nuque	grise.
Bec	gris foncé à l'extrémité claire.
Œil	orangé à rouge.
Poitrine	lavande.
Ailes	bouclier lavande, rémiges primaires et secondaires lavande avec la hampe gris foncé.
Queue	rectrices extérieures lavande à l'extrémité blanche, rectrices centrales lavande, la hampe est gris foncé.

Défauts
Couleur du manteau trop hétérogène ou trop orangé, couleur de la bande de nuque insuffisamment visible.

LAVANDE DILUE



Apparence d'ensemble
Tourterelle lavande dilué : gris bleuté tendre très clair autant que possible uniforme.

Description de la coloration

Tête	lavande dilué.
Bande de nuque	lavande dilué, sa présence n'est visible que par la structure différente des plumes à cet endroit.
Bec	gris à l'extrémité claire.
Œil	orangé à rouge.
Poitrine	lavande dilué.
Ailes	bouclier lavande dilué, rémiges primaires et secondaires lavande dilué.
Queue	rectrices extérieures lavande dilué à l'extrémité blanche, rectrices centrales lavande dilué.

Défauts
Couleur du manteau trop hétérogène ou trop orangé.

ORANGE



Apparence d'ensemble
Tourterelle à manteau orangé et à bande de nuque gris clair.

Description de la coloration

Tête	crème orangé clair, légèrement plus foncée chez la femelle.
Bande de nuque	gris clair.
Bec	corne foncé.
Œil	brun rouge.
Poitrine	crème orangé clair.
Ailes	bouclier orangé, plus foncé chez la femelle, rémiges primaires gris très clair à la hampe beige, rémiges secondaires gris très clair à orange.
Queue	rectrices extérieures gris-beige avec l'extrémité blanche, rectrices centrales orangées, base des rectrices gris clair.

Défauts
Couleur du manteau pas assez soutenue, hétérogène, traces de perlage, tête, cou, poitrine de couleur trop lilas, bande de nuque impure, base des rectrices trop foncée.

ORANGE CLAIR



Apparence d'ensemble
Tourterelle à manteau orangé à bande de nuque et vols blancs.

Description de la coloration

Tête	crème orangé clair, légèrement plus foncée chez la femelle.
Bande de nuque	blanche.
Bec	corne clair.
Œil	brun rouge.
Poitrine	crème orangé clair.
Ailes	bouclier orangé, rémiges primaires blanches à hampe colorée, rémiges secondaires blanc à orangé.
Queue	rectrices extérieures blanc bordé de orange, rectrices centrales orangées, base des rectrices blanche.

Défauts
Couleur du manteau pas assez soutenue, hétérogène, traces de perlage, tête, cou, poitrine de couleur trop lilas, bande de nuque impure, base des rectrices colorée.

PECHE



Apparence d'ensemble
Tourterelle à manteau pêche : crème orangé

Description de la coloration

Tête	crème rosé, légèrement plus orangée chez la femelle.
Bande de nuque	brune avec liseré beige présent sur la partie supérieure. Le liseré est souhaitable sur la partie inférieure mais n'est pas exigé.
Bec	corne clair.
Œil	orangé à rouge.
Poitrine	crème rosé.
Ailes	bouclier pêche, rémiges primaires gris-beige, rémiges secondaires gris-beige à crème orangé.
Queue	rectrices extérieures gris-brun avec l'extrémité blanche, rectrices centrales pêche, base des rectrices brune.

Défauts
Couleur du manteau hétérogène, tête et poitrine trop claires, absence de liseré supérieur sur la bande nuque, œil trop clair ou terne, base des rectrices trop claire.

PECHE POUDRE



Apparence d'ensemble
Tourterelle à manteau pêche poudré : crème orangé poudré du manteau à la queue, à tête et poitrine crème orangé.

Description de la coloration

Tête	crème orangé, légèrement plus orangée chez la femelle.
Bande de nuque	brune avec liseré beige présent sur la partie supérieure. Le liseré est souhaitable sur la partie inférieure mais n'est pas exigé.
Bec	corne clair.
Œil	orangé à rouge.
Poitrine	crème orangé.
Ailes	bouclier pêche légèrement poudré, rémiges primaires gris-beige bordées de beige, rémiges secondaires gris-beige bordées de crème orangé.
Queue	rectrices extérieures gris-brun avec l'extrémité blanche, rectrices centrales pêche, base des rectrices brune.

Défauts
Couleur du manteau homogène, tête et poitrine trop foncées, absence de liseré supérieur sur la bande de nuque, œil trop clair ou terne, base des rectrices trop foncée ou trop claire.

PECHE CLAIR



Apparence d'ensemble
Tourterelle à manteau pêche : crème orangé, à bande de nuque et à vols blancs.

Description de la coloration

Tête	crème rosé, légèrement plus orangé chez la femelle.
Bande de nuque	blanche.
Bec	corne clair.
Œil	orangé à rouge.
Poitrine	crème rosé.
Ailes	bouclier pêche, rémiges primaires blanches, rémiges secondaires blanches à pêche.
Queue	rectrices extérieures blanches, rectrices centrales pêche. Base des rectrices blanche**.**

Défauts
Couleur du manteau pas assez soutenue, hétérogène, traces de perlage. Tête, cou, poitrine de couleur trop claire, bande de nuque impure, base des rectrices colorée.

PECHE DILUE



Apparence d'ensemble
Tourterelle de couleur pêche dilué : crème orangé très clair

Description de la coloration

Tête	pêche dilué.
Bande de nuque	brune.
Bec	corne clair.
Œil	orangé à rouge.
Poitrine	pêche dilué.
Ailes	bouclier pêche dilué non homogène, rémiges primaires blanches, rémiges secondaires de blanc à pêche dilué.
Queue	rectrices extérieures blanches, rectrices centrales pêche dilué, base des rectrices brune.

Défauts
Couleur pêche dilué trop pâle ou trop foncé, bec trop foncé.

SAUVAGE



Apparence d'ensemble
Tourterelle à manteau sauvage : brun foncé, à tête et poitrine lilas (mauve).

Description de la coloration

Tête	lilas, légèrement brune chez la femelle.
Bande de nuque	noire avec liseré blanc présent sur la partie supérieure. Le liseré est souhaitable sur la partie inférieure mais n'est pas exigé.
Bec	noir.
Œil	brun rouge.
Poitrine	lilas soutenu, plus clair chez la femelle.
Ailes	bouclier sauvage, rémiges primaires brun très foncé bordées de gris clair, rémiges secondaires gris foncé à sauvage.
Queue	rectrices extérieures brun foncé avec l'extrémité blanche, rectrices centrales sauvage, base des rectrices noire.

Défauts
Couleur du manteau non homogène, pas assez intense, poitrine lilas terne, absence de liseré supérieur sur la bande nuque, œil trop clair ou terne, base des rectrices trop claire.

CLEMENTINE



Aspect général
Tourterelle à manteau clémentine : orange soutenu, à tête et poitrine lilas (mauve).

Description de la coloration

Tête	lilas, légèrement clémentine sur le dessus chez la femelle.
Bande de nuque	brun très foncé avec liseré blanc présent sur la partie supérieure. Le liseré est souhaitable sur la partie inférieure mais n'est pas exigé.
Bec	corne à l'extrémité foncée.
Œil	brun rouge.
Poitrine	lilas soutenu, plus clair chez la femelle.
Ailes	bouclier clémentine, rémiges primaires grises bordées beige, rémiges secondaires grises bordées de beige à clémentine.
Queue	rectrices extérieures grises avec l'extrémité blanche, rectrices centrales clémentine, base des rectrices brun foncé.

Défauts
Couleur du manteau non homogène, pas assez soutenue, poitrine lilas terne, absence de liseré supérieur sur la bande nuque, œil trop clair ou terne, base des rectrices trop claire.

CLEMENTINE POUDRE



Apparence d'ensemble

Tourterelle à manteau clémentine poudré : orange soutenu poudré du manteau à la queue, à tête et poitrine lilas (mauve).

Description de la coloration

Tête	lilas, légèrement orangé sur le dessus chez la femelle.
Bande de nuque	brun très foncé avec liseré blanc présent sur la partie supérieure. Le liseré est souhaitable sur la partie inférieure mais n'est pas exigé.
Bec	corne à l'extrémité foncée.
Oeil	brun rouge.
Poitrine	lilas.
Ailes	bouclier clémentine poudré, rémiges primaires grises bordées beige, rémiges secondaires grises bordées de beige à clémentine.
Queue	rectrices extérieures grises avec l'extrémité blanche, rectrices centrales clémentine poudré, base des rectrices brun foncé

Défauts

Dessin poudré insuffisamment exprimé sur le manteau, absence de liseré supérieur sur la bande nuque, œil trop clair ou terne, base des rectrices trop claire.

CLEMENTINE DILUE



Apparence d'ensemble
Tourterelle à manteau clémentine dilué : crème orangé atténué et à poitrine et tête crème lilas atténué.

Description de la coloration

Tête	lilas atténué.
Bande de nuque	brun foncé.
Bec	corne clair plus ou moins taché.
Œil	brun rouge.
Poitrine	lilas atténué.
Ailes	bouclier clémentine dilué non homogène, rémiges primaires beige clair, rémiges secondaires beige clair à clémentine dilué.
Queue	rectrices extérieures beige clair avec l'extrémité blanche, rectrices centrales beige clair, base des rectrices gris brun.

Défauts
Couleur clémentine dilué trop pâle ou trop foncé, bec trop clair ou trop foncé.

MANDARINE



Apparence d'ensemble
Tourterelle à manteau mandarine : orangé foncé, à tête et poitrine lilas (mauve).

Description de la coloration

Tête	lilas, légèrement orangée sur le dessus chez la femelle.
Bande de nuque	grise.
Bec	de corne foncé à presque noir.
Œil	brun rouge.
Poitrine	lilas soutenu, plus clair chez la femelle.
Ailes	bouclier mandarine homogène et soutenu, rémiges primaires gris bleuté, rémiges secondaires gris bleuté à mandarine.
Queue	rectrices extérieures gris bleuté avec l'extrémité blanche, rectrices centrales mandarine, base des rectrices gris bleuté.

Défauts
Couleur du manteau pas assez intense, non homogène, traces de perlage, poitrine lilas terne, bande de nuque impure ou trop claire, œil trop clair ou terne.

MANDARINE CLAIR



Apparence d'ensemble
Tourterelle à manteau mandarine : orangé foncé, à tête et poitrine lilas (mauve), à bande nuque blanche et vols clairs.

Description de la coloration

Tête	lilas, légèrement orangée sur le dessus chez la femelle.
Bande de nuque	blanche.
Bec	corne.
Œil	brun rouge.
Poitrine	lilas soutenu, plus claire chez la femelle.
Ailes	bouclier mandarine homogène et soutenu, rémiges primaires blanches à hampe colorée, rémiges secondaires blanc bordées mandarine à entièrement mandarine.
Queue	rectrices extérieures grises à extrémité blanche, rectrices centrales mandarine, base des rectrices blanche.

Défauts
Couleur du manteau pas assez intense, non homogène, traces de perlage, poitrine lilas terne, bande de nuque impure, œil trop clair ou terne.

LES TOURTERELLES GRIS PERLE

Gris perlé abricot
Gris perlé pêche
Gris perlé orange
Gris perlé mandarine



Description du dessin gris perlé
Les tourterelles gris perlé ont les plumes du manteau, du croupion et de couverture de la queue gris-beige clair pour l'abricot, la pêche et l'orange, gris bleuté pour la mandarine, crayonnées de couleur abricot, pêche, orange ou mandarine selon la variété. La couleur s'accentue vers l'extrémité de la plume pour former une bordure.

Pour tous les autres critères de coloration, se référer à la description de la couleur concernée : abricot cendré, pêche, orange et mandarine.

Défauts
Dessin perlé manquant de netteté, de régularité ou de pureté, défauts relatifs à la couleur concernée.

	Tête	Bande de nuque	Bec	Œil	Poitrine	Bouclier
Gris perlé abricot	crème abricot très clair	gris très clair	corne foncé	gris pointillé orangé à rouge	crème abricot très clair	plumes crayonnées abricot
Gris perlé pêche	crème pêche très clair	gris très clair	corne foncé	brun rouge	crème pêche très clair	plumes crayonnées pêche
Gris perlé orange	beige clair	gris très clair	corne foncé	brun rouge	beige clair	plumes crayonnées orange
Gris perlé mandarine	lilas	gris bleuté	corne foncé presque noir	brun rouge	lilas	plumes crayonnées mandarine

	Rémiges primaires	Rémiges secondaires	Rectrices externes	Rectrices centrales	Base des rectrices
Gris perlé abricot	beige clair, presque blanches hampe beige	beige clair à beige clair perlé abricot	gris beige avec l'extrémité blanche	gris beige liseré abricot	gris beige
Gris perlé pêche	beige clair, presque blanches hampe beige	beige clair à beige clair perlé pêche	gris beige avec l'extrémité blanche	gris beige liseré pêche	gris beige
Gris perlé orange	beige clair, presque blanches hampe beige	beige clair à beige clair perlé orange	gris beige avec l'extrémité blanche	gris beige liseré orange	gris beige
Gris perlé mandarine	gris-bleuté	gris bleuté à gris bleuté mandarine	gris bleuté avec l'extrémité blanche	gris bleuté liseré mandarine	gris bleuté





LES TOURTERELLES BLANC PERLE

Blanc perlé abricot
Blanc perlé pêche
Blanc perlé rosé
Blanc perlé orange
Blanc perlé mandarine



Description du dessin blanc perlé
Les tourterelles blanc perlé ont les plumes du manteau, du croupion et de couverture de la queue blanches crayonnées de couleur. Les rémiges primaires sont blanches. Les rémiges secondaires sont de couleur blanche à blanc crayonné.
Les rectrices sont blanches ou très légèrement bordées de la même couleur que le manteau. La bande de nuque est blanche.

Pour tous les autres critères de coloration, se référer à la description de la couleur concernée : rosé clair, abricot clair, pêche clair, orange clair, mandarine clair.

Défauts
Dessin perlé manquant de netteté, de régularité ou de pureté. Défauts relatifs à la couleur concernée.

	Tête	Bande de nuque	Bec	Œil	Poitrine	Bouclier
Blanc perlé abricot	crème abricot très clair	blanche	corne clair	gris pointillé orangé à rouge	crème abricot très clair	plumes crayonnées abricot
Blanc perlé pêche	crème pêche très clair	blanche	corne clair	brun rouge	crème pêche très clair	plumes crayonnées pêche
Blanc perlé rosée	rosée	blanche	blanc rosé	brun rouge	rosé très clair	plumes crayonnées rosé
Blanc perlé orange	beige clair	blanche	corne à l'extrémité plus claire	brun rouge	crème orangé clair	plumes crayonnées orange
Blanc perlé mandarine	lilas	blanche	corne foncé extrémité claire	brun rouge	lilas	plumes crayonnées mandarine

	Rémiges primaires	Rémiges secondaires	Rectrices externes	Rectrices centrales	Base des rectrices
Blanc perlé abricot	blanches	blanches à blanc perlé abricot	blanches	blanc très légèrement bordé abricot	blanche
Blanc perlé pêche	blanches	blanches à blanc perlé pêche	blanches	blanc très légèrement bordé pêche	blanche
Blanc perlé rosée	blanches	blanches à blanc perlé rosée	blanches	blanc très légèrement bordé rosé	blanche
Blanc perlé orange	blanches	blanches à blanc perlé orange	blanches	blanc très légèrement bordé orange	blanche
Blanc perlé mandarine	blanches	blanches à blanc perlé mandarine	blanches	blanc très légèrement bordé mandarine	blanche

LES TOURTERELLES BLANC PERLE A DESSUS BLANC

Blanc perlé abricot à dessus blanc
Blanc perlé pêche à dessus blanc
Blanc perlé rosé à dessus blanc
Blanc perlé orange à dessus blanc
Blanc perlé mandarine à dessus blanc



Description du dessin perlé à dessus blanc.
Les tourterelles blanc perlé à dessus blanc ont les plumes du manteau et de couverture de la queue blanches crayonnées de couleur. Les rémiges sont blanches. Le cœur est entièrement blanc et peut rejoindre la bande de nuque elle-même blanche.
Les rectrices sont blanches ou très légèrement bordées de la même couleur que le manteau. La tête peut être parsemée de plumes blanches.

Pour tous les autres critères de coloration, se référer à la description de la couleur concernée : rosé clair, abricot clair, pêche clair, orange clair, mandarine clair.

Défauts
Dessin perlé manquant de netteté, de régularité ou de pureté, trop de plumes colorées sur le cœur, mauvaise couleur des yeux, défauts relatifs à la couleur concernée.

	Tête	Bande de nuque	Bec	Œil	Poitrine	Bouclier
Blanc perlé abricot à dessus blanc	crème abricot très clair, presque blanche	blanche	corne clair	gris pointillé orangé à rouge	crème abricot très clair	plumes crayonnées abricot cœur blanc
Blanc perlé pêche à dessus blanc	crème pêche très clair, presque blanche	blanche	corne clair	brun rouge	crème pêche très clair	plumes crayonnées pêche cœur blanc
Blanc perlé rosée à dessus blanc	rosée	blanche	blanc rosé	brun rouge	rosé très clair	plumes crayonnées rosé cœur blanc
Blanc perlé orange à dessus blanc	beige clair parsemé de plumes blanches	blanche	corne à l'extrémité plus claire	brun rouge	crème orangé clair	plumes crayonnées orange cœur blanc
Blanc perlé mandarine à dessus blanc	lilas parsemé de plumes blanches	blanche	corne foncé extrémité claire	brun rouge	lilas	plumes crayonnées mandarine cœur blanc

	Rémiges primaires	Rémiges secondaires	Rectrices externes	Rectrices centrales	Base des rectrices
Blanc perlé abricot à dessus blanc	blanches	blanches	blanches	blanches	blanche
Blanc perlé pêche à dessus blanc	blanches	blanches	blanches	blanches	blanche
Blanc perlé rosée à dessus blanc	blanches	blanches	blanches	blanches	blanche
Blanc perlé orange à dessus blanc	blanches	blanches	blanches	blanches	blanche
Blanc perlé mandarine à dessus blanc	blanches	blanches	blanches	blanches	blanche

LES TOURTERELLES A COU COLORE

Cou coloré abricot délavé
Cou coloré pêche délavé
Cou coloré rosé délavé
Cou coloré orange délavé
Cou coloré mandarine délavé



Apparence d'ensemble
Les tourterelles à cou coloré sont majoritairement blanches à l'exception de l'avant du bouclier, du cou, de la poitrine et de la tête dont la couleur de base est délavée. L'intensité de cette couleur délavée ainsi que du dessin diminue progressivement vers l'arrière dans un dégradé régulier. Les becs sont plus ou moins tachés.

Défauts
Absence de dégradé ou dégradé trop brutal.



	Tête	Bande de nuque	Bec	Œil	Poitrine	Bouclier
Cou coloré abricot délavé	abricot délavé	blanche	corne clair	gris pointillé orangé à rouge	abricot délavé	plumes liserées abricot très clair
Cou coloré pêche délavé	pêche délavé	blanche	corne clair	brun rouge	pêche délavé	plumes liserées pêche très clair
Cou coloré rosé délavé	rosé délavé	blanche	blanc rosé	brun rouge	rosé délavé	plumes liserées rosé très clair
Cou coloré orange délavé	orange délavé	blanche	corne à l'extrémité plus claire	brun rouge	orange délavé	plumes liserées orange très clair
Cou coloré mandarine délavé	mandarine délavé	blanche	corne foncé extrémité claire	brun rouge	mandarine délavé	plumes liserées mandarine très clair

	Rémiges primaires	Rémiges secondaires	Rectrices externes	Rectrices centrales	Base des rectrices
Cou coloré abricot délavé	blanches	blanches	blanches	blanches	blanche
Cou coloré pêche délavé	blanches	blanches	blanches	blanches	blanche
Cou coloré rosé délavé	blanches	blanches	blanches	blanches	blanche
Cou coloré orange délavé	blanches	blanches	blanches	blanches	blanche
Cou coloré mandarine délavé	blanches	blanches	blanches	blanches	blanche

LES TOURTERELLES A TETE COLOREE

Tête colorée prune
Tête colorée grise
Tête colorée orange



Apparence d'ensemble
Les tourterelles à tête colorée sont à dominante blanche, affecté d'un léger voile coloré avec une tête de couleur prune, grise ou orangée et des plumes de même teinte présentes de manière aléatoire sur le corps.
En fonction de la température extérieure lors de la mue, l'intensité et la répartition des marques peuvent être différentes. Ainsi, un même oiseau n'a pas forcément le même aspect d'une année sur l'autre.

Description de la coloration

Tête	fortement teintée de couleur colorée (prune, grise ou orange).
Bande de nuque	brun foncé ou blanche, sa présence n'étant alors visible que par la structure différente des plumes à cet endroit.

Bec	corne foncé chez la prune et la grise, corne chez l'orange.
Œil	orangé à rouge.
Poitrine	blanche avec un léger voile coloré prune, gris ou orangé, possibilité de taches de couleur.
Ailes	bouclier blanc avec un léger voile coloré prune, gris ou orangé, possibilité de tâches de couleur, vols blancs avec possibilité de quelques rémiges colorées.
Queue	rectrices blanches avec possibilité de quelques rectrices colorées prune, grises ou orange.

Défauts

Tête insuffisamment colorée, bande de nuque irrégulière ou incomplète.



	Tête	Bande de nuque	Bec	Œil	Poitrine	Bouclier
Tête colorée prune	prune	brun foncé	foncé, presque noir	orangé à rouge	blanche voile coloré prune	blanche voile coloré prune
Tête colorée grise	grise	brun foncé	foncé, presque noir	orangé à rouge	blanche voile coloré gris	blanche voile coloré gris
Tête colorée orange	orange	blanche	corne	orangé à rouge	blanche voile coloré orangé	blanche voile coloré orangé

	Rémiges primaires	Rémiges secondaires	Rectrices externes	Rectrices centrales	Base des rectrices
Tête colorée prune	Blanches possibilité de rémiges colorées	blanches possibilité de rémiges colorées	blanches possibilité de rectrices colorées	blanches possibilité de rectrices colorées	blanche
Tête colorée grise	Blanches possibilité de rémiges colorées	blanches possibilité de rémiges colorées	blanches possibilité de rectrices colorées	blanches possibilité de rectrices colorées	blanche
Tête colorée orange	Blanches possibilité de rémiges colorées	blanches possibilité de rémiges colorées	blanches possibilité de rectrices colorées	blanches possibilité de rectrices colorées	blanche

LES TOURTERELLES GRISON



Apparence d'ensemble
Le gène grison peut affecter la coloration de toutes les variétés de tourterelles.
Il s'exprime par un écaillage blanc ou gris d'intensité variable sur les boucliers, de même son effet est visible sur la tête et la poitrine des couleurs les plus foncées par une dépigmentation de l'extrémité des plumes.

Liste des couleurs permettant une expression suffisante du gène grison : abricot, abricot clair, abricot cendré, blond givré, fauve givré, blonde, fauve, orange, orange clair, pêche, pêche clair, gris, gris poudré, sauvage, clémentine, mandarine, mandarine clair, blanc perlé abricot, blanc perlé pêche, blanc perlé orange, blanc perlé mandarine, blanc perlé abricot à dessus blanc, blanc perlé pêche à dessus blanc, blanc perlé orange à dessus blanc et blanc perlé mandarine à dessus blanc.

Pour tous les autres critères de coloration, se référer à la description de la couleur concernée.

Défauts
Dessin grison manquant de netteté, mal réparti, ou insuffisamment exprimé.


Grison mandarine


Grison sauvage

LES TOURTERELLES PANACHEES



Apparence d'ensemble
Les tourterelles panachées ont un manteau à dominante colorée, parsemé de façon régulière, de plumes blanches. Elles sont bicolores ou tricolores. La ou les deux couleurs du manteau vont conditionner la couleur de la bande de nuque.

Les combinaisons de couleur pour **les bicolores** sont les suivantes : blanc rosé, blanc champagne, blanc abricot, blanc sauvage, blanc fauve, blanc blond, blanc gris, blanc orange, blanc crème, blanc pêche, blanc clémentine.

Les combinaisons de couleur pour **les tricolores** sont les suivantes : blanc sauvage fauve, blanc fauve orange, blanc blond orange, blanc gris sauvage, blanc gris fauve, blanc pêche fauve.

Description de la coloration


Tête	blanche mouchetée dans l'une ou les deux couleurs du manteau.
Bande de nuque	**pour les bicolores** - noire pour blanc sauvage, blanc fauve, blanc blond et blanc gris, - brun foncé pour blanc clémentine, - blanche pour blanc rosé, blanc champagne et blanc abricot, - blanche ou orange ou blanche et orange pour blanc orange, - grise pour blanc crème et blanc pêche. **pour les tricolores** - noire pour blanc sauvage fauve, blanc gris sauvage et blanc gris fauve, - noire, blanche et orange pour blanc fauve orange et blanc blond orange, - noire et grise pour blanc pêche fauve.
Bec	corne clair pour les sujets à bande de nuque blanche, crayonné ou à extrémité foncée dans les autres variétés.
Œil	brun pour toutes les variétés sauf pour blanc crème et blanc rosé chez lesquelles il est rouge.
Poitrine	blanche mouchetée dans l'une ou les deux couleurs du manteau.
Ailes	bouclier panaché bicolore ou tricolore, présence simultanée de rémiges blanches et de rémiges colorées.
Queue	présence simultanée de rectrices blanches et de rectrices colorées.


Défauts

Panachage irrégulier, vols ou queue entièrement blancs ou entièrement colorés.



Panachée bicolore
blanc fauve


Panachée bicolore
blanc pêche



Panachée bicolore
blanc rosé


Panachée bicolore
blanc orange


Panachée bicolore
blanc crème


Panachée bicolore
blanc blond

LES TOURTERELLES PANACHEES A EPAULETTES



Apparence d'ensemble
Les tourterelles panachées à épaulettes ont le manteau entièrement coloré à l'exception de quelques plumes blanches, harmonieusement réparties de chaque côté, sur la partie antérieure du bouclier. Elles sont bicolores ou tricolores. La ou les deux couleurs du manteau vont conditionner la couleur de la bande de nuque.

Les combinaisons de couleur pour les bicolores sont les suivantes : blanc rosé, blanc champagne, blanc abricot, blanc sauvage, blanc fauve, blanc blond, blanc gris, blanc orange, blanc crème, blanc pêche, blanc clémentine.

Les combinaisons de couleur pour les tricolores sont les suivantes : blanc sauvage fauve, blanc fauve orange, blanc blond orange, blanc gris sauvage, blanc gris fauve, blanc pêche fauve.

Description de la coloration

Tête blanche mouchetée dans l'une ou les deux couleurs du manteau.

Bande de nuque

pour les bicolores

- noire pour blanc sauvage, blanc fauve, blanc blond et blanc gris,
- brun foncé pour blanc clémentine,
- blanche pour blanc rosé, blanc champagne et blanc abricot,
- blanche ou orange ou blanche et orange pour blanc orange,
- grise pour blanc crème et blanc pêche.

pour les tricolores

- noire pour blanc sauvage fauve, blanc gris sauvage et blanc gris fauve,
- noire, blanche et orange pour blanc fauve orange et blanc blond orange,
- noire et grise pour blanc pêche fauve.

Bec corne clair pour les sujets à bande de nuque blanche, crayonné ou à extrémité foncée dans les autres variétés.

Oeil brun pour toutes les variétés sauf pour blanc crème et blanc rosé chez lesquelles il est rouge.

Poitrine blanche mouchetée dans l'une ou les deux couleurs du manteau.

Ailes bouclier unicolore ou bicolore agrémenté de quelques plumes blanches, harmonieusement réparties, dans la partie supérieure, rémiges primaires et secondaires majoritairement colorées.

Queue rectrices majoritairement colorées.

Défauts

Manteau trop panaché, épaulettes insuffisantes, envahissante ou dissymétriques. Rémiges ou rectrices majoritairement blanches.


Panachée à épaulettes
blanc pêche


Panachée à épaulettes
blanc orange

LES TOURTERELLES TACHETEES



Apparence d'ensemble
Les tourterelles tachetées ont un manteau à dominante blanche, parsemé de façon régulière de plumes colorées. Elles sont bicolores ou tricolores.

Les combinaisons de couleur pour les **bicolores** sont les suivantes : blanc rosé, blanc champagne, blanc abricot, blanc sauvage, blanc fauve, blanc blond, blanc gris, blanc orange, blanc crème, blanc pêche, blanc clémentine.

Les combinaisons de couleur pour les **tricolores** sont les suivantes : blanc sauvage fauve, blanc fauve orange, blanc blond orange, blanc gris sauvage, blanc gris fauve, blanc pêche fauve.


Description de la coloration

Tête	blanche, légèrement mouchetée dans l'une ou les deux couleurs du manteau.
Bande de nuque	elle est très peu présente en raison du blanc dominant du manteau. Lorsqu'elle est présente, la couleur est la même que celle des panachées.

Bec	corne clair, crayonné dans les variétés foncées.
Œil	brun pour toutes les variétés sauf pour blanc crème et blanc rosé chez lesquelles il est rouge.
Poitrine	blanche, légèrement mouchetée dans l'une ou les deux couleurs du manteau.
Ailes	bouclier tacheté bicolore ou tricolore, rémiges majoritairement blanches, seules quelques rémiges colorées.
Queue	rectrices majoritairement blanches, seules quelques rectrices colorées.

Défauts

Plumes colorées en nombre insuffisant ou réparties de manière trop irrégulière. Rémiges ou rectrices majoritairement colorées.





LES TOURTERELLES SOYEUSES



Apparence d'ensemble
La tourterelle soyeuse existe dans toutes les variétés.

Description
La soyeuse possède une structure du plumage particulière due à la disparition des crochets qui le maintiennent naturellement en bon ordre. Son aspect est "ébouriffé", doux au toucher, d'où son nom.

Jugement
Cette structure de plumage fait partie intégrante de l'aspect général de cette tourterelle. Sa présence doit faire apparaître un ensemble très aérien par ses ailes « en bateau » ou encore sa queue large et pas très jointive.

Défauts
Corps grossier par ajout de races autres que la Tourterelle rieuse ou trop faible ; aspect soyeux du plumage insuffisant ; gène soyeux envahissant ayant pour effet de raréfier le plumage ; ailes trop serrées pas assez en bateau ; queue trop serrée par manque d'expression du gène soyeux.


Soyeuse grise


Soyeuse tachetée bicolore
blanc blond


Soyeuse fauve givré

LES TOURTERELLES AVEC ATTRIBUTS de STRUCTURE



Apparence d'ensemble
Les tourterelles à huppe, coquille, visière ou toupet existent dans toutes les variétés et peuvent être combinées entre elles (coquille et visière, huppe et toupet).

Description de l'ornement occipital

La huppe est constituée de plumes redressées formant une pointe et situées à l'arrière de la tête. Elle doit être bien effilée et placée haut ; elle ne présente pas de raie.

La coquille est composée de plusieurs rangées de plumes se relevant sur la nuque et formant un arc de cercle.

La visière est une petite touffe de plumes placées à rebours sur le front et retombant sur le bec qu'elle recouvre en débordant de chaque côté.

Le toupet est une petite touffe de plumes placée à rebours sur le front et bien relevée.

Jugement
Aspect général, proportions et élégance, plumage, couleur, tête et yeux, structure de la tête, comportement.

Défauts
Huppe trop large, de travers, ouverte ou fendue, placée trop bas, raie trop marquée ; coquille trop ouverte, interrompue ou incomplète, mal implantée ; visière trop ample ou trop petite, interrompue ou incomplète ; toupet trop long ou trop peu présent, retombant trop sur le bec.

